

CRESOPHENE

Roztok pro desinfekci kořenového kanálku a ošetření caries profunda

<i>Složení:</i>	dexamethasone acetát	0,111 g
	thymol	5,00 g
	Příspěvky q.s.p.	100 g

Balení:

Roztok pro dentální použití.

Lahvička 13 ml

Lahvička 45 ml

Farmako-terapeutické zařazení:

Dentální produkt pro profesní použití

Výrobce:

Septodont, Francie

Použití:

Roztok pro desinfekci kořenového kanálku.

Upozornění:

Nepoužívejte v případě dětí do věku 30 měsíců. Dále je-li u pacienta alergie na jednu ze složek, zvláště pak na kortikosteroidy a fenoly. Pouze pro vnější použití. Nenamáčejte přebytečně peletku. Neaplikujte na odhalenou pulpu. V případě pochyb se poraďte s ošetřujícím lékařem.

Interakce léků:

Abyste zamezili možné interakci mezi podobnými léky, je třeba každou další léčbu konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Návod k použití:

Po avulzi gangrenózní pulpy a postupném vyčištění, vsuňte do kanálku tampon navlhčený roztokem a opatrně jej zde vyždímejte, aby nedošlo k přetečení roztoku. Provizorně zapečete nekompresní a lehkým cementem. Nechejte na místě 3 – 5 dnů. Je-li třeba, pak po vyčištění kanálku postup opakujte obvyklým způsobem.

Předávkování:

V případě předávkování či nesprávného použití, fenoly mohou způsobit nadměrný periapický zánět a periodontitidu.

Vedlejší efekty:

Jako další aktivní ingredience, tento lék může v některých případech způsobit vedlejší efekty. Je zde riziko lokální alergie. V tomto případě ihned vše konzultujte s Vaším ošetřujícím lékařem.

Skladování:

Dodržujte dobu expirace uvedenou na lahvičce. Skladujte do teploty 25oC