

ENDOMETHASONE

Antiseptický, neдрáždívý, nevstřebatelný kořenový výplňový materiál obsahující Hydrocortison acetát.

Složení:

Prášek:	
Dexamethason	0,1 g
Hydrocortison acetát	1,00 g
Tymol jodid	25,00 g
Paraformaldehyd	2,20 g
Radioopakní přísady q.s.	100,00 g
Tekutina:	
Eugenol	91 ml
Pepermint – Anise q.s.	100 ml

Vlastnosti

Existují přísná kritéria pro výběr kořenové výplně. Především naprostá tolerance periapikálními tkáněmi – není žádoucí, aby ošetření vznikla v okolí apexu lokální reakce způsobená jakoukoli složkou kořenové výplně.

Výplňová pasta by měla přiléhat ke stěnám kořenového kanálku, neměla by být resorbovatelná nebo podléhat smršťování během času. Výplň by měla mít antiseptický účinek trvajících několik hodin po zaplnění kanálku – vždy existuje možnost, že v kanálku zůstali po extirpaci pulpy zbytky organických hmot. Tento účinek musí přetrvávat dokud pasta tvrdne. To samé platí v protizánětlivém účinku kortikoidů. Výplň by po ztvrdnutí měla být nevstřebatelná, ale odstranitelná. Radioopacita výplně je nutnou podmínkou. Endomethasone obsahuje kortikoidy, které brání vzniku bolestivých periapikálních zánětů. Endomethasone obsahuje účinná antiseptika (malé množství paraformaldehydu a tymol jodid.) Antiseptika i kortikoidy se z pasty uvolňují pouze během doby tuhnutí a jejich terapeutický účinek je tedy časově limitován.

V případě, že se malé množství pasty dostane do kontaktu s měkkými tkáněmi, eugenol proniká do okolí, které je drážděno, dokud pasta zcela nezuhne. V tomto případě, na rozdíl od pasty v kanálku, se materiál pomalu resorbuje.

Indikace

Definitivní kořenová výplň.

Použití

Smíchejte prášek a tekutinu do takové konzistence, aby se snadno nanášela lentulí do kořenových kanálků.

Doporučujeme míchat 1 díl prášku a 1 díl tekutiny po dobu 40 sek.

Dodávané množství

Prášek: Lahvička obsahující cca 14 g

Tekutina: Lahvička obsahující 10 ml

Hu-Fa
dental

Moravni 909, 760 02 Otrokovice, Tel.: 577 926 226 - 7,

Fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz