

## NEOCONES

Dentální konusy

### **Složení (na 50mg konus):**

Neomycin sulfát	15 400U
Benzocain	5.00mg
Pšeničný škrob	2.50mg
monohydratovaná laktóza	10.50mg
mikrokrytalická celulóza	9.50mg
magesium stearát	0.50mg

### **Indikace:**

Pomocná léčba dentální alveolity po vyšetření a vyčištění lůžka. Doporučujeme věnovat pozornost také oficiálnímu doporučení pro dezinfekci.

### **Použití:**

Pouze pro lokální použití. Sterilně vyjměte 1 či 2 konusy z lahvičky a vložte je do dentálního lůžka poté, co jste ho vyšetřili a vyčistili. U velmi malých lůžek můžete konus ustříhnout. Díky svému tvaru je velice snadné uchopit konus kleštičkami.

### **Kontraindikace:**

Hyperseznitivita na benzokain (či na esterové lokální anestetika). Alergie na neomycina či na antibiotika stejné skupiny. Nelze použít v primární dentice (děti mladší 12-ti let).

### **Upozornění:**

Produkt musí být opatrně používán u dětí, kterým může způsobit methaemoglobinaemii. Informujte se u pacienta na jeho alergii. Byl-li pacient ošetřen neomycinem v měsíci, který předcházel extrakci zubu, je zde možná rezistence. U sportovců může vyvolat pozitivní dopingový nález.

V případě těhotných žen se nedoporučuje použití Neocones – neomycin je aminoglykosid způsobující ototoxické riziko.

Během kojení je možno při dodržení postupu aplikovat Neocones. Exkrece aminoglykosidů v mateřském mléce je zdokumomentována – je nízká. Stejně tak neexistují záznamy na možnou exkrece benzokainu.

Neocones má minimální či střední vliv na řidiče a osoby ovládající stroje vyžadující pozornost.

### **Vedlejší účinky:**

Riziko alergické reakce díky kros-senzibilaci s para-aminobenzoidními deriváty (sulfamidy, některými lokálními anestetiky ...). Riziko alergie na neomycin.

### **Předávkování:**

Při běžném použití nehrozí riziko předávkování.

### **Životnost:**

2 roky

### **Skladování:**

Skladujte při teplotě do 25°C, na temném a suchém místě.

### **Balení:**

31ml zabarvená lahvička s 50 konusy (uzavřená polyurethanovou ochrannou pěnou)

100ml zabarvená lahvička se 200 konusy (uzavřená polyurethanovou ochrannou pěnou)

**Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice**

**tel.: 577 926 226-7, fax: 577 926 205**

**[www.hufa.cz](http://www.hufa.cz), [hufa@hufa.cz](mailto:hufa@hufa.cz)**