

## **PULPÉRYL**

Roztok pro dentální použití

*Složení (na 100 ml roztoku):*

Lidocain hydrochlorid	6.163 g
Medicínský kreozetový olej	28.650 g
Fenol	20.500 g
Eugenol	40.637 g
Benzyl alkohol	6.150 g
Alkohol	3.260 g
Rafinovaná voda	0.840 g

*Farmaceutická forma:*

Roztok

*Terapeutická indikace:*

- pulpítida
- pulpoperiodontitida

*Návod k použití:*

Pouze pro lokální aplikaci.

Exerezni sedativum:

Naimpregnujte bavlněnou peletku a po vyčištění a izolaci zubu ji vložte do kavity. Poté zakryjte dočasnou apreturu, netlačte.

Dočasná mezipretura při léčbě kanálků:

Vláknó gázy navlhčené roztokem se zavádí k podrážděnému nervu po částečném vyčištění kanálku.

*Kontraindikace:*

Zvýšená citlivost na některou ze složek, zvláště na lidokain nebo na lokální anestetikum.

*Zvláštní varování a doporučení pro použití*

Doporučujeme vždy aplikovat dočasnou apreturu co nejvíce hermeticky je to možné, aby nedošlo ke kontaktu produktu s mukózou.. V případě nechtěného kontaktu opláchněte vodou.

Nepolykejte. Je třeba varovat sportovce, že produkt obsahuje aktivní složku, která může způsobit pozitivní test při antidopingové kontrole.

*Vedlejší efekty:*

Riziko zvýšené citlivosti na lokální anestetikum (lidokain).

*Předávkování:*

Není známo nebezpečí

*Farmakodynamické vlastnosti*

Sedativum pro dentální použití

(A: nervový systém a metabolismus)

Lidokain hydrochlorid: lokální anestetikum, amidová skupina

Kreozet: dentální sedativ a antiseptikum

Fenol, eugenol: antiseptikum

*Životnost, skladování:*

3 roky. Při teplotě pod 25°C.

*Balení:*

Lahvička 13ml

Lahvička 45ml

*Výrobce:*

Septodont, Francie