

Mirafluor®- (k) gel

INFORMACE: Informace pro uživatele

Co je Mirafluor gel a k čemu se používá?

Mirafluor- (k) gel je fluoridový gel, určený k prevenci zubního kazu. Používá se k léčbě počátečních kazů nebo k léčbě hypersenzitivních zubů.

Co je třeba zvážit před použitím Mirafluor gelu?

Mirafluor- (k) gel by neměl být používán v případě alergie na Fluorid sodný nebo jinou složku.

Zvláštní opatrnost je nutná u osob, u kterých není zaručená správná funkce polykacího reflexu (například některé zdravotní postižení).

Mirafluor- (k) gel je určen pro děti. Musí být aplikován pod dohledem.

Pro děti mladší 7 let NEVHODNÉ.

Jak se používat Mirafluor- (k) gel?

Musí být dodržena důkladná hygiena dutiny ústní, aby se zabránilo vzniku zubního kazu. Používejte týden asi 1,5 cm mirafluor- (k) gel;

Asi 4 minuty nechte gel působit, poté gel opláchněte.

Je třeba se vyhnout velké množství gelu.

Předávkování může způsobit nevolnost, zvracení a průjem. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Aplikace v zubní ordinaci:

Mirafluor- (k) může být aplikován do vhodných nosičů (Mirafluor zásobníku - REF 605 621), nebo gel aplikujte pomocí Brush (Mirabrush - REF 605 461).

V případě, že je zde zvýšené riziko vzniku zubního kazu, doporučují se měsíční aplikace.

Aplikace Spoon v zubní ordinaci se používá u dětí pouze od 8 let.

Jak uchovávat Mirafluor- (k) gel?

Udržujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.

Skladovací podmínky:

Skladovat v suchu a chránit před slunečním zářením.

Skladovací teploty 0 ° C - v souladu s 28 ° C.

Další informace:

Účinná látka je fluorid sodný.

100 g Mirafluor-gel, obsahující 2720 g fluoridu sodného.

To odpovídá obsahu fluoridu 1,23%.

100 g Mirafluor-k-gel s obsahem 1,360 g fluoridu sodného.
To odpovídá obsahu fluoridu 0,615%.