inej zdrej zapálenia. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvorí vyrážka/ vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchajte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vypláchnutí. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Obsah/nádobu zaveďte na miesto likvidácie v príslušnom zberovom mieste.

SL ID 220 Dezinfekcija sevda

ID 220 je zelo učinkovita uporabna raztopina za samodejno dezinfekcijo in čiščenje vseh površin, vključno s instrumenti (sevedi in nerjavni jekleni in legirana jekla, diamantnih instrumentov, instrumentov za konvencionalno in ultrazvočno čiščenje ID 220 ne poškoduje materialov zaradi posebnih korozijskih inhibitorjev.

Sestava: 100 g ID 220 vsebuje: 15 g 1-propanol, kaljilni inhibitor, gensečilno sredstvo.

Spektar učinkovanja: Bakteriostatski, bakteriolucidni, fungicidni, virusidni v skladu z priporočili. Ko je primer verjetnega vstopnega vhoda v HBV, HCV in HIV", ter virusi brez ovojnice, kot so adenovirusi[4], poliomavirusi SV 40[5], poliovirusi[6]). **Seznam VAH/DGHM.** Preverjen v skladu s EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

[1] Navodilo o izvedbi ukrepov Robert Koch Inštituta
[2] V skladu s priporočilom RKI (Robert Koch Institut) (Ministrstvo za zdravstvo 47, 62-66, 2004.

Uporaba: Instrumentom pobrišite takoj po uporabi v ID 220. Čas učinkovanja znaša v banjici 1 minut in v ultravočni napravi 5 minut, za inaktiviranje virusov 1 minut.

Dezinficirane instrumente vzemite iz kopeli, jih izperite pod tekočo vodo, jih takoj posušite in po potrebi sterilizirajte. Čas učinkovanja upoštevajte raztopine je mlako. 7 dni. Pri večji onesnaženosti s krvjo, slino itd. priporočamo da raztopino obnovite dva- do trikrat na teden.

Napotki: V ID 220 ne vnašajte materialov odvzetih iz človeškega telesa (npr. kosti, zobovje, kožo, kri, sline, urin, itd.). Ne uporabljajte na aldehide ali alkohol kot so lahko in barvaste kovine (aluminij, medenina itd.) ali dodatkih instrumentov zaščiteih z umetnimi smolami. Za to je primerno ID 213, ID 212 torte ali ID 212. Pri sevedih in rokavih iz trdih kovin, instrumentov za konvencialne kaniže z ročkama kodranimi rožcami, keramičnih brušilnih telesih je potrebno preveriti neškodljivost ID 220.

[1] glej nastik.

Nevarno. Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hude poškodbe oči. Povzroča draženje kože. Ne peti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz. Ob nastopu draženja pokožbe: Izpeljati se poleni vpojlivo podlžlo zdravniški pomoč/oskrbo. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljuje z izpiranjem. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hranili v tesno zaprti posodi. Odstraniti vsebino/posodo nevarnih ali posebnih odpadkov.

Distributor: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512572834

HR ID 220 Dezinfekcija bušilica

ID 220 izmjenu je djelotvorna, gotova uporabna otopina za automatsku dezinfekciju i čišćenje rotirajuih instrumenata (bušilica i glodalica) ID 220 u kombinaciji s ultrazvučnim uređajima, diamantnih instrumenata za čišćenje konjenjskih kanala itd.) ID 220 štiti materijal pomoću posebnih inhibitora korozije.

Sastav: 100 g sredstva ID 220 sadrži 15 g propan-1-ola, kalijhidroksid, tvari za keliranje, inhibitore korozije i pomoćne tvari u tragovima.

Raspon djelovanja: baktericidno, uklj. bakterije tuberkuloze, fungicidno[1], virucidno[2] (svojeni virusi kao je Vaccinia, adjuvirusi, HBV, HCV i HIV te neovijeni virusi kao što su adenovirusi, Polyoma SV 40, poliovirusi). **Na popisu VAH/DGHM.** Testirano u skladu s direktivama EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

[1] - Isprbana na glijevce Candida albicans i Aspergillus niger.
[2] V skladu s priporočilom Instituta Robert Koch (Zaveja za javno zdravstvo Republike Slovenije 47, 62-66, 2004.

Primjena: instrumente nakon korištenja odmah odložiti u otopinu sredstva ID 220. Vrijeme djelovanja u sterilizatoru iznosi tek jedno minutu. U ultrazvučnom uređaju preporučuje se ostavite sredstvo da djeluje 30 sekundi.

Dezinficirane instrumente izvadite iz kupke, isprati ih tekućom vodom, odmah ih osušite i po potrebi sterilizirajte. Trajnost otopine ID 220 iznosi maksimalno sedam dana. Ako je onečišćenje krvlju, slinom itd. Bolje/ttiti svaju kliđetnjak dva do tri puta tjedno promijeniti otopinu.

Upozorenja: u otopinu ID 220 ne stavljajte instrumente načinjene od materijala izvojenih na osnovi aldehida i alkohol. Kao što su bojani metali i legure (aluminij, mesing itd.) ili odredene instrumente tijelima sintetičkom smolom. U takvim slučajevima koristite ID 213, ID 212 torte ili ID 212. Ako čistite bušilice i glodalice načinjene od tvrdih materijala, instrumente za čišćenje konjenjskih kanala s ručkama kodriranima u bolj i keramičke brusilice, provjerite podložnost sredstva ID 220.

[1] vidi otisak.

Opasnost. Tekućina i pari su zapaljivi. Uzrokuje teške oštećenja očiju. Nadražuje kožu. Ne pušiti od otvorenog plamena ili neki drugi izvor. Nositi zaštitne rukavice i naočale/zaštitu za lice. Ako je kožu nadražena ili se pojavio osip: potražite savjet liječnika/zatražiti liječničku pomoć. AKO DODE U DODIR S OČIMA: Nekoliko minuta oprezno ispirati vodom. Po mogućnosti ukloniti kontaktne leće ako postoje. Dalje ispirati. Neprospuno zatvorene spremnike čuvati na dobro zrakonom mjestu. Sadržaj/spremnik zbrinuti sa problematičnim otpadom.

Zastupnik u Hrvatskoj: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7 a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512572834

HU ID 220 Fúrófertőtlenítő

Az ID 220 forgőeszközök (acélbúvó és nemesacélbúvó készült fúrók és marók, gyémántcsiszolók, szívókanülök és műszerek, stb.) automatikus fertőtlenítése és tisztítása ultrahangos berendezés használati oldat. Az ID 220 a speciális korrózós inhibitorok miatt anyagkímélő.

Összetétel: 100 g ID 220 tartalma: 15 g 1-propanol , káliumhidroxid, segédanyagok.

Hatásspektrum: Baktericid, tuberkulocidi, fungicid[1], virucid[2] (burokkal rendelkező vírusok, mint az vaccinia-vírusok, kívül is HBV, HCV és HIV", valamint burok nélküli vírusok, mint pl. adenovírusok[3], polyomavírusok SV 40[4], poliovírusok[5]). **VAH/DGHM-lista.** EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563 szerint ellenőrizve.

[1] - Vizsgálat Candida albicans, Aspergillus niger.
[2] a RKI (Robert Koch Intézet) ajánlása alapján (Szövetségi Egészségügyi Hivatal 47, 62-66, 2004.

Alkalmazás: Használat az eszközöket azonnal be kell tenni az ID 220-ba. A fúrófúrdőben a hatásidő 1 perc, az ultrahangos készülékben 0,5 perc, vírusok inaktiválásra 1 perc.

Vegye ki a fertőtlenített eszközöket a fürdőből, folyó víz alatt öblítse le, azonnal törölje le és adott esetben sterilizálja azokat. A használati oldat maximálisan max. 7 nap. Nagymértékű vér-, nyálszennyeződés, stb. előfordulása esetén javasoljuk az oldat cseréljét heti két-három alkalommal.

Utmutatások: Ne tegyen bele ID 220-ba olyan anyagokat, pl. könnyű- és színesfémekket (alumínium, sárgaréz, stb.) vagy bizonyos műgyantával ragasztott műszereket az ID 220-ba. Erre leginkább az ID 213, ID 212 forte vagy ID 212. alkalmas. Keményfémből készült fúrók és marók, szárkötő fogantyúval rendelkező szívókanülök esetén ellenőrizni kell az anyagkímélő hatás. Bizonyos alkalmazásokban esetleben ellenőrizni kell az összeférhetőséget az ID 220-szal.

[1] lásd a nárynomtatott dokumat.

Veszélyes! Gőzeinek/gőzeinek és gőz. Súlyos szemkárosodást okoz. Bőrirritáció hatása. Tűs nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra szemben, valamint szikrázás szemben tilos. Ne lélegezze be a gőzöket. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell igénybe venni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megtehető. Folytassa az öblítést. Tartsa hűvös helyen. Tárolóedény/tartály bezárva. Az edény szorosan lezárva tartandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

Importőr: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7 a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512572834

EE ID 220 Puuri desinfitseerija

ID 220 on eriti tõhus valmis kasutustaoks pöörlevate instrumentide (teraskuulpuur ja roostevabast terasest puurid ja freesid, teemantinstrumendid, juurekanali instrumendid jne) iseesivaks desinfitseerimiseks ja puhastamiseks. ID 220 on tõhus eriline korrosioonipõgustele materjale sõlastes.

Koostis: 100 g ID 220 sisaldab: 1-propanool 15 g, kaalumõõdukõrgsisal, abiained.

Mõõgaspektr: Bakteriostaatiline, tuberkuloolsitsiidne, fungitsiidne[1], virutsiidne[2] (kattega virused, nagu vaktsiinivirus, s.a HBV, HCV ja HIV", kuid ka kattega virused, nagu adenoviirused[3], polyomaviirused SV 40[4], poliovõiruseid[5]). **VAH/DGHM nimekiri**. Kontrollitud vastavalt EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563-le.

[1] - Katsetatud Candida albicansiga, Aspergillus niger'iga.
[2] - Vastavalt Robert Koch instituudi soovitustele (Sõeskonna tervishoiuamet 47, 62-66, 2004.

Rakendamine: Pärast kasutamist asetage ID 220 ja kasutamisel ID 220-sse. Mõõgaeg on leotuvannis 1 minutit ja ultrahelisadmes 0,5 minutit, viiruste inaktiveerimiseks 1 minutit.

Võtke desinfitseeritud instrumendid vannist, loputage voolava vee all, kuivatage kohemult ja vajadusel steriliseerige. Kasutuslahuse eeskaeg on maks. 7 päeva. Kõrgendatud vere, süljе või muu kõrmmuse puhul soovitame lahust uuendada kaks kuni kolm korda nädalas.

Mõrkused: Ärge seatage ID 220-sse leelistele ja alkoholile tundlikke materjale, nagu kerg- või värvilisi metalle (alumiinium, messing jne) või mõningaid tehisvaigupõhise kleebitud instrumente. Selleks sobib ID 213, ID 212 forte või ID 212. Kõvasõlmistel puuridel ja freesidel ning värvkoodiga gibemel ja keraamilise lihvimisehkega juurekanali instrumentide puhul tuleb ID 220 talluvust kontrollida.

[1] - vt. pakendi

Ettevaatus! Tulekõtkk vedelik ja aur. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Põhjustab nahaärritust. Mitte pihustada leekidesse või muusse süütelallikasse. Kandke kaitsekindad ja kaitsepriille/näokaitse. Pärast hakkamist pöörduda arsti poole. ÜLEMISE SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult vesega. Eemaldage kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida muhel lihedalt suletuna. Sisu/mahutit kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike jäätmete kogumispunkt).

LV ID 220 Urbju dezinfekcijas līdzeklis

ID 220 ir ļoti ietekmīgs gatavais šķidums automātiskai rotējošo instrumentu (urbju, frēzēm, tērauda urbjiem, dimanta instrumentiem, kanālu līrēšanas instrumentu u.tml.) dezinfekcijai un tīrīšanai. ID 220 ir drošs materiālam pateicoties korozijas inhibitoriem.

Sastāvs: 100 g ID 220 satur: 15 g 1-propanola, kālija hidroksīds, palīgvielas.

Darbības spektrs: baktericīds, tuberkulocīds, fungicīds[1], virusocīds[2] (apvalkotie vīrusi, kā vaccinia vīrusi, tostarp HBV, HCV un HIV", kā arī neapvalkotie vīrusi, kā adenovīrusi[3], polyomavīrusi SV 40[4], poliovīrusi[5]). **VAH/DGHM saraksts**. Pārbaudīts atbilstoši EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

[1] - Testēts ar Candida albicans, Aspergillus niger.
[2] - Saskaņā ar RKI (Robert Koch institūts) ieteikumiem (Veselības veselības kodekss 47, 62-66, 2004.

Lietošana: Pēc nepieciešamības ielieciet instrumentus tīrīs ID 220. Mērķaustīšanas laiks trīstošā ir 1 minūte un ultraskaņas ierīcē 0,5 minūtes, vīrusi inaktivēšanai par 1 minūte.

Dezinficētos instrumentus izņemiet no vannas, noskalojiet zem tekošā ūdens un, tūlīt nožāvējiet un, ja nepieciešams, sterilizējiet. Ieteicamais ekspozīcijas laiks ir 7 dienas, ja ir ievērots pareizs. Pie piesārņotāju nosūtījuma ar asiņim, sekalātim u.tml. mēs iesakām izdaļmu nomainīt mēnesī. Tīrīšanas laiks.

Brīdinājumi: ID 220 nedrīkst lietot jūtīgu pret sārmiem un alkoholu materiālu ir ieņemtas instrumentus. Piemēram, metālus (piemēram, vara vai noteikus ar sintētiskajiem sveķiem sastāpinotās instrumentu. Tam ir piemērots ID 213, ID 212 forte vai ID 212. No kaļošās izgatavotos urbjus un frēzes, kanālu līrēšanas instrumentus ar kāsu kodītiem galvenām ņemiem rīvēšanas instrumentus ir jāpārbauda uz noturību pret ID 220.

[1] - skatīt etiketes.

Bīstami. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Kairina ādu. Neizmantojiet uz atklātas uguns vai citiem aizdedzes avotiem. Nesmēķēt. Izmantojiet aizsargcimdus un aci/ acu aizsargājošu sejas aizsargu. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: izsaukt medicīnisko palīdzību. SASKARE AR ACĪM: uzmanīgi izskalojiet pāris minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var veikt ērtāk. Turpināt skalošanu. Uzglabāšana: Uzglabāšanas temperatūra 1 minūti. Vēlāk dezinfitsēšanai instrumendā vannist, lopatage voolava vee all, kuivatage kohemult ja vajadusel steriliseerige. Kasutuslahuse eeskaeg on maks. 7 päeva. Kõrgendatud vere, süljе või muu kõrmmuse puhul soovitame lahust uuendada kaks kuni kolm korda nädalas.

Mārkuseid: Ärge seatage ID 220-sse leelistele ja alkoholile tundlikke materjale, nagu kerg- või värvilisi metalle (alumiinium, messing jne) või mõningaid tehisvaigupõhise kleebitud instrumente. Selleks sobib ID 213, ID 212 forte või ID 212. Kõvasõlmistel puuridel ja freesidel ning värvkoodiga gibemel ja keraamilise lihvimisehkega juurekanali instrumentide puhul tuleb ID 220 talluvust kontrollida.

[1] - vt. pakendi

Ettevaatus! Tulekõtkk vedelik ja aur. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Põhjustab nahaärritust. Mitte pihustada leekidesse või muusse süütelallikasse. Kandke kaitsekindad ja kaitsepriille/näokaitse. Pärast hakkamist pöörduda arsti poole. ÜLEMISE SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult vesega. Eemaldage kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida muhel lihedalt suletuna. Sisu/mahutit kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike jäätmete kogumispunkt).

LT ID 220 Urbjų dezinfekcijos līdzeklis

ID 220 ir ļoti ietekmīgs gatavais šķidums automātiskai rotējošo instrumentu (urbju, frēzēm, tērauda urbjiem, dimanta instrumentiem, kanālu līrēšanas instrumentu u.tml.) dezinfekcijai un tīrīšanai. ID 220 ir drošs materiālam pateicoties korozijas inhibitoriem.

Sastāvs: 100 g ID 220 satur: 15 g 1-propanola, kālija hidroksīds, palīgvielas.

Darbības spektrs: baktericīds, tuberkulocīds, fungicīds[1], virusocīds[2] (apvalkotie vīrusi, kā vaccinia vīrusi, tostarp HBV, HCV un HIV", kā arī neapvalkotie vīrusi, kā adenovīrusi[3], polyomavīrusi SV 40[4], poliovīrusi[5]). **VAH/DGHM saraksts**. Pārbaudīts atbilstoši EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

[1] - Testēts ar Candida albicans, Aspergillus niger.
[2] - Saskaņā ar RKI (Robert Koch institūts) ieteikumiem (Veselības veselības kodekss 47, 62-66, 2004.

Lietošana: Pēc nepieciešamības ielieciet instrumentus tīrīs ID 220. Mērķaustīšanas laiks trīstošā ir 1 minūte un ultraskaņas ierīcē 0,5 minūtes, vīrusi inaktivēšanai par 1 minūte.

Dezinficētos instrumentus izņemiet no vannas, noskalojiet zem tekošā ūdens un, tūlīt nožāvējiet un, ja nepieciešams, sterilizējiet. Ieteicamais ekspozīcijas laiks ir 7 dienas, ja ir ievērots pareizs. Pie piesārņotāju nosūtījuma ar asiņim, sekalātim u.tml. mēs iesakām izdaļmu nomainīt mēnesī. Tīrīšanas laiks.

Brīdinājumi: ID 220 nedrīkst lietot jūtīgu pret sārmiem un alkoholu materiālu ir ieņemtas instrumentus. Piemēram, metālus (piemēram, vara vai noteikus ar sintētiskajiem sveķiem sastāpinotās instrumentu. Tam ir piemērots ID 213, ID 212 forte vai ID 212. No kaļošās izgatavotos urbjus un frēzes, kanālu līrēšanas instrumentus ar kāsu kodītiem galvenām ņemiem rīvēšanas instrumentus ir jāpārbauda uz noturību pret ID 220.

[1] - skatīt etiketes.

Bīstami. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Kairina ādu. Neizmantojiet uz atklātas uguns vai citiem aizdedzes avotiem. Nesmēķēt. Izmantojiet aizsargcimdus un aci/ acu aizsargājošu sejas aizsargu. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: izsaukt medicīnisko palīdzību. SASKARE AR ACĪM: uzmanīgi izskalojiet pāris minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var veikt ērtāk. Turpināt skalošanu. Uzglabāšana: Uzglabāšanas temperatūra 1 minūti. Vēlāk dezinfitsēšanai instrumendā vannist, lopatage voolava vee all, kuivatage kohemult ja vajadusel steriliseerige. Kasutuslahuse eeskaeg on maks. 7 päeva. Kõrgendatud vere, süljе või muu kõrmmuse puhul soovitame lahust uuendada kaks kuni kolm korda nädalas.

Mārkuseid: Ärge seatage ID 220-sse leelistele ja alkoholile tundlikke materiālu, nagu kerg- või värvilisi metālus (alumiinium, messing jne) või mõningaid tehisvaigupõhise kleebitud instrumentus. Selleks sobib ID 213, ID 212 forte või ID 212. Kõvasõlmistel puuridel ja freesidel ning värvkoodiga gibemel ja keraamilise lihvimisehkega juurekanali instrumentide puhul tuleb ID 220 talluvust kontrollida.

[1] - vt. pakendi

Ettevaatus! Tulekõtkk vedelik ja aur. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Põhjustab nahaärritust. Mitte pihustada leekidesse või muusse süütelallikasse. Kandke kaitsekindad ja kaitsepriille/näokaitse. Pärast hakkamist pöörduda arsti poole. ÜLEMISE SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult vesega. Eemaldage kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida muhel lihedalt suletuna. Sisu/mahutit kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike jäätmete kogumispunkt).

BG ID 220 Дезинфектант за бормани

ID 220 е високоефективен, готов за употреба работен разтвор, който е способен на автоматична дезинфекция на ротиращи инструменти (борери и фрези от обикновена и високоустойчива на корозия стомана, диамантени борери) и инструменти, инструменти за обработване на корокен канали и др.). ID 220 е безопасен за материалите, благодарение на специални корозионни инхибитори.

Състав: 100 g ID 220 съдържат 15 g пропан-1-ол, калиев хидроксид, комплексообразуватели, корозионни инхибитори и помощни вещества в следи.

Спектър на действие: Бактерицидно вл. ТБК, фунгицидно[1], вирулоцидно[2] (вируси с обвивка, като Vaccinia-вируси, вкл. вируси гепатита В, гепатита С и ВИЧ", а также безоболочновия вируси типа Adeno-вируси[3], Polyoma-вирусов SV 40[4], Polio-вирусов[5]). **Списък** на Асоциацията за приложна химия (**VAH**)/Германското дружество за хигиена и микробиология (**DGHM**). Изпитан съгласно EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

[1] - Тест с Candida albicans, Aspergillus niger.
[2] - Съгласно препоръчката на Институт "Robert Koch" (Bundesgesundheitsamt 47, 62-66, 2004).

Употреба: Поставяйте инструментите в ID 220 веднага след употреба. Времето за експозиция в стерилизатор на фреза е минута. В ултразвуковата баня е 0,5 минути, инструментарият е въжможно времето за експозиция да се удължи на 30 до 60 минути. В ултразвуковия апарат пре-

ларвяте ваши са сянка, залиц, ет. концентрация на разтвора е по-ниска. Ако е замърсен с кръв, слюнка и т.н., препоръчваме да сменяте разтвора ежедневно.

Индикации: Неподходящ за алкали и алкохол, ще ги ръжди. Ако е замръзнал, не трябва да се нагрява. Не е подходящ за ръждиеустойчиви материали, напр. алуминиеви, медни и т.н. Не е подходящ за инструменти с пластмасови дръжки. Не е подходящ за инструменти, изработени от корозиращи материали. Не е подходящ за инструменти, изработени от корозиращи материали. Не е подходящ за инструменти, изработени от корозиращи материали

DE ID 220 Bohrer-Desinfektion

ID 220 ist eine hochwirksame Speziallösung für die selbsttätige Desinfektion und Reinigung rotierender Instrumente (Bohrer und Fräser aus Stahl und Edelstahl, Diamant-Instrumente, Wurzelkanalinstrumente etc.). ID 220 ist mindestens bactericid durch spezielle Kombinationsmittel.
Zusammensetzung: 100 g ID 220 enthalten: 1-Propanol 15 g, Kaliumhydroxid, Hilfsstoffe.
Wirkungsspektrum: Bakterizid, tuberkulozid, fungizid[1], virizid[2] (behüllte Viren wie Vaccinia-Viren inkl. HBV, HCV und HIV[3] sowie unbehüllte Viren wie Adeno-, Polyoma-Viren, SV 40[3], Polio-Viren[3]). **WAN/DGHM-Liste. DGHM/P-Verzeichnis. IHO Virucide-Liste.** Geprüft gegen DIN EN 14561, DIN EN 14562, DIN EN 14563, DIN EN 14561, DIN 14562.
Anwendung: Instrumente nach Gebrauch soft in ID 220 einlegen. Die Einwirkzeit beträgt im Fräsator 1 Minute und im Ultraschallgerät 5 Minuten, zur Instrumentenpflege und Vorreinigung 15 Minuten.

Anwendung	Konzentration	Einwirkungszeit
Instrumentendesinfektion (nach DGHM)	1 Min.	
Bakterien inkl. Tb und Pilze[1]	100 %	1 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV, HCV, HIV-Viren[2]	100 %	0,5 Min.
Adeno-Viren[2]	100 %	0,5 Min.
Polyoma-Viren SV 40[2]	100 %	0,5 Min.
Polio-Viren[2]	100 %	1 Min.

[1] Prüfung mit Candida albicans, Aspergillus niger.
[2] Normalit Desinfizierung des RKI (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

Nach der Einwirkzeit desinfektes Instrumentarium gründlich unter fließendem Wasser abspülen, sofort abtrocknen und gegebenenfalls sterilisieren. Die Standzeit der Gebrauchslösung beträgt max. 7 Tage. Bei erhöhter Belastung mit Blut, Speichel, etc. empfehlen wir eine Lösung zwei- bis dreimal wöchentlich zu erneuern.
Hinweise: Alkali- und alkoholhaltige Materialien wie Leicht- und Buntmetalle (Aluminium, Messing etc.) oder bestimmte kunststoffgebundene Materialien nicht in ID 220 einlegen. Nur eignen sich ID 213, ID 212 forte oder ID 212. Bei Bohrern und Fräsern aus Hartmetall, hochlegierten Stählen, hartverchromten Bohrern, keramischen Schleifkörpern ist die Verträglichkeit gegenüber ID 220 zu prüfen.

siehe Aufdruck.

Gefahr: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenirritationen. Verursacht Hautreizungen. Nach jeder offenen Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort einen Arzt/Ärzten Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Vertrieb in Österreich: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 2a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512/572834
Vertrieb in Schweiz: DÜRR DENTAL AG
Gerberstraße 18b, 8200 Hörn, Switzerland ☎ +41 718441030

EN ID 220 Bur disinfection

ID 220 is a ready-diluted solution for the disinfection and cleaning of rotary instruments (drills, diamonds, root canal instruments etc.). ID 220 contains special anti-corrosives.
Composition: 100 g ID 220 contain: 15 g 1-propanol, potassium hydroxide, adjuvants.
Effective spectrum: Bactericidal, tuberculocidal, fungicidal[1], virucidal activity[2] (encapsulated viruses such as vaccinia viruses, incl. HBV, HCV, HIV[3] as well as non-encapsulated viruses, such as adeno viruses, polyoma viruses SV 40[3], polio viruses[3]). **List of VAH/DGHM.** Tested in accordance with EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.
[1] Testing with Candida albicans, Aspergillus niger.
[2] In accordance with the recommendations of the RKI (Robert Koch Institute) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).
Directions for use: After use, immediately place instruments in ID 220. The contact time is 1 minute in the bur disinfector and in the ultrasonic cleaner 0,5 minutes, for the inactivation of viruses 5 minute.
Rinse disinfected instruments in running water, dry immediately and sterilize, if necessary. Use an equipment of the profile of care to clean du visage. En cas d'irritation ou d'irruption cutanée: consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si il est possible et si elles peuvent être enlevées facilement. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé hermétiquement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

DÜRR DENTAL FRANCE
8, rue Paul Henkel, 92500 Rueil-Malmaison, France
☎ +33 1/55180000

see imprint.

Danger. Flammable liquid and vapour. Causes serious eye damage. Causes skin irritation. Do not spray on an open flame or other ignition source. Wear protective gloves and eye/face protection. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

DÜRR DENTAL (Products) UK Ltd.
1 Lindwall Way, Sheet Road, Industrial Estate
Kettering, Northants NN16 8PS, United Kingdom ☎ +44 1536526740

FR ID 220 Désinfection des fraises

ID 220 est une solution pour la désinfection et le nettoyage instruments rotatifs (fraises, diamants, instruments de canal radiculaires etc.). ID 220 contient des inhibiteurs de corrosion spéciaux.
Composition: ID 220 contient du 1-propanol 15 % (149 g/l), hydroxyde de potassium, adjuvants.
Spectre d'activité: Bactéricide, tuberculocide, fongicide[1], virucide[2] (virus enveloppés tels que virus de la vaccine et VHB, VHC, VIH[3], ainsi que virus sans enveloppe tels qu'adénovirus[2], polyomavirus SV 40[2], poliovirus[2]). **Liste VAH/DGHM. Liste ADF.** Ce produit a été contrôlé selon les prescriptions des normes EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.
[1] Test réalisé avec des Candida albicans, Aspergillus niger.
[2] Conformément aux recommandations de l'RKI (Robert Koch Institut, Allemagne) (Bulletin fédéral de santé 47, 62-66, 2004).
Mode d'emploi: Après utilisation, déposer les instruments immédiatement dans ID 220. La durée d'action s'élève à 1 minute dans le Fraseur et à 0,5 minutes dans l'appareil à ultra-sons. Pour les virus nous recommandons 1 minute. Rincer les instruments désinfectés à l'eau courante, les sécher de suite et les stériliser si nécessaire. Le bain de ID 220 peut être utilisé 7 jours au maximum. En cas de charge accrue par du sang, de la salive, etc., nous recommandons de renouveler la solution deux à trois fois par semaine.
Précautions: Ne pas utiliser le bain ID 220 pour les matériaux sensibles aux alcalins ou à l'alcool comme des pièces d'aluminium et fraises coulées à résine de synthèse. A cet effet, nous recommandons ID 213, ID 212 forte ou ID 212. Dans le cas des foreuses et fraises en métal dur, des aciers spéciaux et des aciers chromés, vérifier à code de couleur, des meubles en céramique, la compatibilité avec ID 220 et le pouvoir anticorrosif.

voir le marquage.

Danger. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Porter des gants de protection et un équipement de protection pour les yeux du visage. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si il est possible et si elles peuvent être enlevées facilement. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé hermétiquement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

DÜRR DENTAL FRANCE
8, rue Paul Henkel, 92500 Rueil-Malmaison, France
☎ +33 1/55180000

voir imprimé.

Danger. Flammable liquid and vapour. Causes serious eye damage. Causes skin irritation. Do not spray on an open flame or other ignition source. Wear protective gloves and eye/face protection. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

DÜRR DENTAL (Products) UK Ltd.
1 Lindwall Way, Sheet Road, Industrial Estate
Kettering, Northants NN16 8PS, United Kingdom ☎ +44 1536526740

IT ID 220 Disinfezione di fresе

ID 220 è una soluzione pronta per la disinfezione e pulizia di strumenti rotanti fresе in acciaio, diamantate, strumenti per la terapia canalicolare etc. ID 220 contiene inoltre speciali inibitori anticorrosivi.
Composizione: 100 gr ID 220 contengono 15 gr alcool propilico, 2 gr idrossido di potassio, sostanze coloranti e acqua.
Spettro di azione: Battericida, tuberculoside, fungicida[1], virucida[2] (virus capsulati come vaccinavirus, compresi HBV, HCV e HIV, ma anche virus non capsulati, quali gli adenovirus, polyomavirus SV 40[2], poliovirus[2]). **Lista VAH/DGHM.** Testato secondo le norme EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.
[1] Test con Candida albicans, Aspergillus niger.
[2] Secondo le raccomandazioni dell'RKI (Robert Koch Institut) (Dipartimento Salute Federale 47, 62-66, 2004).
Uso: Subito dopo l'uso immergere gli strumenti nella soluzione ID 220. Il tempo di azione nel contenitore-potatrese è normalmente di 1 minuto e di 0,5 minuti e nell'apparecchio ad ultrasuoni, per virus 1 minuto. Sciacquare gli strumenti disinfettati con acqua corrente, asciugarli subito e se necessario sterilizzarli. La soluzione preparata rimane stabile al massimo 7 giorni. In caso di forte deturpazione a causa di sangue, saliva, ecc., si raccomanda di sostituire la soluzione due o tre volte alla settimana.
Precauzioni: Non immergere nella soluzione ID 220 materiali sensibili ad alcali e all'alcool, come parti d'alluminio e fresе realizzate alla resina sintetica, in quest'caso usare ID 213, ID 212 forte o ID 212. Per fresе e punte da trapano in carburo metallico, strumenti per carie radicale con manigliа codificata a colore e corpi di rettifica ceramici, deve essere verificata la compatibilità con ID 220.

vedi stampo.

Pericolo. Liquido e vapori infiammabili. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Indossare guanti e protezioni per gli occhi e per il viso. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se si portano e se è possibile farlo facilmente. Conservare il recipiente ben chiuso e in luogo ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

DÜRR DENTAL ITALIA S.r.l.
Via Dell'Artigianato n. 8, 20053 Moglio, Italy ☎ +39 0395970300

vedi imprimo.

ES ID 220 Desinfección de fresas

El ID 220 es una solución de uso para desinfectar y limpiar instrumentos rotatorios (fresas, diamantes, instrumentos radiculares, etc.).
Composición: 100 g contienen 15 g propanol, hidróxido potásico, sustancias auxiliares.
Espectro de actividad: Bactericida, tuberculocida, fungicida[1], virucida[2] (virus con envoltura, como los virus de la vaccinia, además de los virus VHB, VHC, VIH[3] así como virus sin envoltura como los adenovirus[2], los polomavirus[2], los poliovirus[2]). **Lista de la VAH/DGHM.** Probado según las normativas EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.
[1] Ensayo realizado con Candida albicans, Aspergillus niger.
[2] Conforme a la recomendación del RKI (Robert Koch Institut) (Adm. Federal de la Salud, Publica 47, 62-66, 2004).
Modo de empleo: Colocar los instrumentos inmediatamente después de su uso en ID 220. El tiempo de actuación en el contenedor para pulverizar (Fraasator) es 1 min. y en el aparato ultrasónico 0,5 min., para la desactivación de los virus recomendamos 1 min. Enjuagar con agua corriente los instrumentos desinfectados, secarlos en seguida y en caso dado, esterilizarlos. La durabilidad de la solución de uso es de un máximo de 7 días. Con un incremento de cantidad de sangre, saliva, etc. recomendamos cambiar la mezcla de uno a dos tres veces por semana.
Precauciones: No emplear el ID 220 para materiales sensibles a los álcalis y alcoholes, como p. ej. objetos de aluminio o perforadoras pegados con resina sintética, en este caso recomendamos ID 213, ID 212 forte o ID 212. Debe probarse la compatibilidad de ID 220 con los taladros de metal duro, aceros especiales y aceros cromados antodóntico con empaulados identificada por colores y con los piezas esmeriladas.

véase lo grabado.

Peligro. Líquido y vapores inflamables. Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Usar guantes/gafas/máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Sacar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Distribuido por Portugal por: DÜRR DENTAL MEDICES IBERIA S. A.
Sierra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga
08210 Barberà del Vallès (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

NL ID 220 Boren-desinfectie

ID 220 is een gebruiksklare oplossing voor desinfectie en reiniging van roterend instrumentarium (boren, diamantenboren etc.). ID 220 voorzien speciaal anticorrosiemiddel.
Samenstelling: ID 220 bevat 1-propanol 15 % (149 g/l), kaliumhydroxide, hulpstoffen.
Werkingsspectrum: bactericide, tuberculocide, fungicide[1], virucide[2] (omhulde virussen zoals vaccinia-virussen, incl. HBV, HCV, HIV[3], alsmede naakte virussen zoals adeno-virussen[2], polyoma-virussen SV 40[2], polio-virussen[2]). **Lijst van VAH/DGHM.** Getest volgens de EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.
[1] Getest met Candida albicans, Aspergillus niger.
[2] De aanraden van het RKI (Robert Koch Institut) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).
Gebruiksaanwijzing: Instrumenten direct na gebruik in de vloeistof leggen. In de fraisbor bedraagt de inwerkingstijd 1 min. en in de ultrasonische reinigingsapparatuur 0,5 min., ter deactivering van virussen 1 min. Na de inwerkingstijd instrumenten onder stromend water afspoelen, droogwrijven en steriliseren. De bekleding van de gebruiksoplossing bedraagt max. 7 dagen. Bij een verhoogde belasting met bloed, speeksel, etc. adviseren wij de oplossing twee- tot driemaal per week te vernieuwen.
B.I.G.: Alle materialen, materialen, zoals aluminium en kunststof kleefstoffen (carbonundumsteenbos b. v.) niet in ID 220 inleggen. Alleen geschikt zijn ID 213, ID 212 forte of ID 212. Bij boren en frezen, hartmetaalboren en frezen, hoogwaardige staalsoorten, verchromde boren, keramische freesinstrumenten moet worden gecontroleerd of de tolerantie van ID 220.

zie stempel.

Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Niet op een open vlam of andere ontstekingsbronnen spuiten. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming dragen. Bij uitslag: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Eventuele contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Houd de verpakking goed gesloten. Inhoud/verpakking afvoeren naar een gevaarlijk afval- of speciaal-afvalstort.

DÜRR DENTAL BELGIUM
Ter Rivierenlaan 97, 3191 Hever, Belgium ☎ +32 15616271

IT ID 220 Disinfezione di fresе

ID 220 è una soluzione pronta per la disinfezione e pulizia di strumenti rotanti fresе in acciaio, diamantate, strumenti per la terapia canalicolare etc. ID 220 contiene inoltre speciali inibitori anticorrosivi.
Composizione: 100 gr ID 220 contengono 15 gr alcool propilico, 2 gr idrossido di potassio, sostanze coloranti e acqua.
Spettro di azione: Battericida, tuberculoside, fungicida[1], virucida[2] (virus capsulati come vaccinavirus, compresi HBV, HCV e HIV, ma anche virus non capsulati, quali gli adenovirus, polyomavirus SV 40[2], poliovirus[2]). **Lista VAH/DGHM.** Testato secondo le norme EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.
[1] Test con Candida albicans, Aspergillus niger.
[2] Secondo le raccomandazioni dell'RKI (Robert Koch Institut) (Dipartimento Salute Federale 47, 62-66, 2004).
Uso: Subito dopo l'uso immergere gli strumenti nella soluzione ID 220. Il tempo di azione nel contenitore-potatrese è normalmente di 1 minuto e di 0,5 minuti e nell'apparecchio ad ultrasuoni, per virus 1 minuto. Sciacquare gli strumenti disinfettati con acqua corrente, asciugarli subito e se necessario sterilizzarli. La soluzione preparata rimane stabile al massimo 7 giorni. In caso di forte deturpazione a causa di sangue, saliva, ecc., si raccomanda di sostituire la soluzione due o tre volte alla settimana.
Precauzioni: Non immergere nella soluzione ID 220 materiali sensibili ad alcali e all'alcool, come parti d'alluminio e fresе realizzate alla resina sintetica, in quest'caso usare ID 213, ID 212 forte o ID 212. Per fresе e punte da trapano in carburo metallico, strumenti per carie radicale con manigliа codificata a colore e corpi di rettifica ceramici, deve essere verificata la compatibilità con ID 220.

vedi stampo.

Pericolo. Liquido e vapori infiammabili. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Indossare guanti e protezioni per gli occhi e per il viso. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se si portano e se è possibile farlo facilmente. Conservare il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

DÜRR DENTAL ITALIA S.r.l.
Via Dell'Artigianato n. 8, 20053 Moglio, Italy ☎ +39 0395970300

vedi imprimo.

DA ID 220 Bor-desinfektion

ID 220 er en brugsklarende opløsning til daglig desinfektion og rengøring af roterende instrumenter (bor, diamanter, rodkanalinstrumenter etc.). ID 220 er indeholder specielle korrosionsinhibitorer.
Sammensætning: 100 g ID 220 indeholder 15 g 1-propanolder, kaliumhydroxid, hjælpestoffer.
Virkespektrum: Baktericid, tuberkulocid, fungicid[1], virucid[2] (indkapslede vira som vaccinia-vira, inkl. HBV, HCV og HIV[3], samt uindkapslede virusser som adeno-virusser[2], polyoma-virusser SV 40[2], polio-virusser[2]). **Liste VAH/DGHM.** Testet i henhold til EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.
[1] Testet med Candida albicans, Aspergillus niger.
[2] Anbefalet af RKI (Robert Koch Institut) (det tyske Sundhedsministerium) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).
Anvendelse: Efter brug lægges instrumenter i ID 220. Virkningstiden i fræsator andrager 1 min. og i ultrylydsapparat 0,5 min., til inaktivering af vira 1 min. Skyl desinficerede instrumenter skylles under rindende vand, tørres og steriliseres om ønsket. Opbevaringstiden for brugsopløsning er max. 7 dage. Ved forøget med blod, syd etc. anbefaler vi, at opløsningen udskiftes to til tre gange om ugen.
Advisninger: Alkali- og alkoholholdsmæssige materialer, aluminium og konstofbundsbehandlet bor mø ikke lægges i ID 220. Hertil egner ID 213, ID 212 forte eller ID 212 sig. Ved bor og fræsere af hårdmetal, rodkanalinstrumenter med farvekodet greb og keramiske slibesvæ skal kompatibiliteten med ID 220 kontrolleres.

se prægning.

Farlig. Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilde. Bærer beskyttelseshandsker og beskyttelse af ansigtsbeskyttelse. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes til et indsamlingssted for farligt affald og problemafald.

EL ID 220 Απολύμανση τρυπανιών

Το ID 220 είναι ένα πολύ δραστικό έτοιμο διάλυμα για την απολύμανση/καθαρισμό και του καθαρισμό των περιστρεφόμενων εργαλείων τρυπάνια και φρέζες από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα, εργαλεία για ριζικά κανάλια κλπ. Το ID 220 περιέχει κοκκίνητα του δοντιού κτλ.). Το ID 220 είναι φιλικό προς τα μέταλλα και τα πλαστικά.
Σύνθεση: το 100 g ID 220 περιέχουν: 1-προπανόλες 15 g, υδροξείδιο του καλίου, βοηθητικές ουσίες.
Φάσμα δράσης: βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο[1], ιοκτόνο[2] (και με περιβάλλομα ιούς οι Vaccinia, συμ. HBV, HCV, HIV[3] καθώς και ιούς χωρίς περιβάλλον, π.χ. αδενοιούς[2], Πολυόμα SV 40[2], ιοί Πολιο[2]). **Κατάλογος VAH/DGHM.** Κατάλογος ADF. Τεστ σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.
[1] Ελέγχεται ανάμεσα Candida, παρ. Aspergillus.
[2] Σύμφωνα με τις συστάσεις του RKI (Robert Koch Institut) (ομοσπονδιακός υπουργείο υγείας) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).
Χρήση: μετά τη χρήση τοποθετήστε τα εργαλεία αμέσως στο ID 220. Χρόνος δράσης για τη φρέζα και τη χρήση του υπερηχητικού συστήματος χρόνο δράσης της τάξης των 1 λεπτά, για τιμή αδρανοποιεί ιός 1 λεπτό. Ξεπλύνετε τα εργαλεία που έχουν απολυμανθεί από τα υπολείμματα. Στεγνώστε με ζεβένιο κρύο, αν χρειαστεί, τα αμέσως και ενδεχομένως αποστειρώστε. Ο μέγιστος χρόνος ζωής του διαλύματος χρήσης ανέρχεται σε μέγιστο τις 7 ημέρες. Σε περίπτωση αυξημένης επιβάρυνσης με αίμα, σάλιο κ.λπ. συνιστούμε τη τακτική αλλαγή του διαλύματος τουλάχιστον δύο φορές τη εβδομάδα.
Προφυλάξεις: Μη χρησιμοποιείτε αυτό το υλικό στα υλικά είναι ευαίσθητα στο αλκάλιο και την αλκοόλη, όπως ελαφρά μέταλλα και πλαστικά δεσμευμένα υλικά. Σε αυτήν τη περίπτωση η συγκεκριμένη εργαλεία ίνα είναι καλύτερη με συνθετικό γόμμα. Ανάλογα με τα εργαλεία τρυπάνια, φρέζες, ανοξείδωτο χάλυβα, ή ρυθμιζόμενη εργαλεία κλπ. Θα πρέπει η ΙΔ 220 ΙΔ 213 ΙΔ 212 forte ΙΔ 212