

GC Fuji LINING™ LC

RADIOPAQUE LIGHT CURED GLASS IONOMER LINING CEMENT

For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE

As a base or liner in prepared cavities.

CONTRAINDICATIONS

- Direct pulp capping.
- Use of this product in patients with known allergies to glass ionomer cement, methacrylic monomer or methacrylate polymer.

COMPOSITION

Powder: Fluoro-alumino-silicate glass, initiator, pigment
Liquid: Methacrylic acid, polyacrylic acid, dimethacrylic acid, carboxylic acid, initiator, stabilizer

DIRECTIONS FOR USE

Powder / Liquid Ratio (g/g)	1.4 / 1.0
Mixing Time (sec.)	15"-25"
Working Time (23°C/73°F) (min., sec.)	3'00"
Light Curing Time (sec.)	30"
Depth of Cure (mm)	1.6

ISO 9917-2 Class 2, Base or lining
Radio-opaque

- POWDER AND LIQUID DISPENSING
 - The standard powder to liquid ratio is 1.4 g/1.0 g. 1 level scoop of powder to 1 drop of liquid.
 - For accurate dispensing of powder, lightly tap the bottle against the hand. Do not shake or invert.
 - Hold the liquid bottle vertically and squeeze gently.
 - Close bottles immediately after use.
- MIXING
 - Dispense powder and liquid onto the pad. Using the plastic spatula, divide the powder into two equal parts. Mix the first portion with all of liquid for 5-10 seconds. Incorporate the remaining portion and mix the whole thoroughly for 10-15 seconds.
- RESTORATIVE TECHNIQUE
 - Prepare tooth using standard techniques. Extensive mechanical retention is not necessary.
 - Wash and dry but DO NOT DESICCATE. CAVITY CONDITIONER or DENTIN CONDITIONER is recommended to remove the smear layer. For pulp capping use calcium hydroxide.
 - Mix the required amount of cement. Working time is 3 minutes from the start of mixing until the cement is no longer workable. Working time is shorter when working time.
 - Remove surface moisture, but DO NOT DESICCATE.
 - Transfer cement to the preparation using a syringe or suitable placement instrument, covering dentine up to the dentino-enamel junction.
 - Light cure for 30 seconds using a visible light curing device (LED / Halogen >700 mW/cm²). Place light source as closely as possible to the cement surface.
 - Note: If application exceeds 1.6 mm in depth, use a layering technique.
 - Proceed with standard composite or amalgam restorative techniques.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39-77°F).

PACKAGES

- Bottle of 10 g powder with scoop
- Bottle of 8 g (6.8 mL) liquid
- 1-pkg.: 10 g powder, 8 g (6.8 mL) liquid, powder scoop, plastic spatula, mixing pads

CAUTION

- In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- DO NOT mix powder with liquid with any other glass ionomer cements.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
- In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <https://www.gc.dental/europe>

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUADAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/euadamed/>) or contact us at Regulatory.gce@gc.dental

Undesired effects - Reporting:
If you become aware of any case of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority on your country's accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 11/2024

MANUFACTURED BY

GC CORPORATION

76-1 Hasunuma-cho, Tabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED BY

GC CORPORATION

76-1 Hasunuma-cho, Tabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE N.V.

Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,

3100 Leuven, Belgium | Tel: +32 16 71 10 100

PRINTED IN JAPAN

GC Fuji LINING™ LC

РЕНТГЕНКОНТРАСТЕН ФОТО -ПОЛИМЕРИЗИРАЩ ГЛАС-ИОНОМЕР ЗА ПОДЛОЖКИ

Da se използва само от дентални лекари, спазвайки инструкциите за употреба.

ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Като основа или подложка в подготвени кавитети.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

- Директно пълнене.
- Избягвайте употребата на този продукт при пациенти с известни алергии към глас-иономерен цимент, метакрилатен мономер или метакрилатен полимер.

СЪСТАВ

Прашк: Флуоро-алумино-силикатно стъкло, инициатор, пигмент
Течност: Метакрилат, вода, полиакрилова киселина, диметакрилат, карбоксилна киселина, инициатор, стабилизатор

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

Съотношение прах / течност (g/g)	1.4 / 1.0
Време за смесване (сек.)	15"-25"
Време за работа (23°C/73°F) (мин., сек.)	3'00"
Време за фото-полимеризиране (сек.)	30"
Дълбочина на полимеризиране (mm)	1.6

ISO 9917-2 Клас 2, Основа или подложка
Рентгеноконтрастен

1. ДАВКОВАНИЕ НА ПРАХ И ТЕЧНОСТ

- Стандартното съотношение прах / течност е 1.4 г./1.0 г. 1 равна лъжичка прахът и една капка течност.
- За прецизно дозиране на праха, леко поклаквайте шишенцето в ръка. Не го разклащайте или обръщайте.
- Обърнете бутилката с течността вертикално и стиснете леко.
- Затворете бутилките веднага след употреба.

2. СМЕСЯВАНЕ

Поставете прах и течност върху блочекот. С пластмасовата шпатула разделете праха на две равни части. Смесете първата половина от праха с цялата течност за 5-10 секунди. Добавете останалата част и смесете цялото за 10-15 секунди.

3. ТЕХНИКА НА ВЪЗСТАВЯВАНЕ

- Подгответе зъба, използвайки стандартни техники. Разширена механична ретенция не е необходима.
- Използвайте прах и течност върху блочекот. За отстраняване на замърсен слой се препоръчва CAVITY CONDITIONER или DENTIN CONDITIONER. За покритване на пуптата, използвайте калциев хидроксид.
- Смесете необходимото количество прах и течност за работа в 3 минути от началото на смесването при 23°C (73°F). По-високи температури ще съкратят времето за работа.
- Използвайте прах и течност върху блочекот. За отстраняване на замърсен слой се препоръчва CAVITY CONDITIONER или DENTIN CONDITIONER. За покритване на пуптата, използвайте калциев хидроксид.
- Смесете необходимото количество прах и течност за работа в 3 минути от началото на смесването при 23°C (73°F). По-високи температури ще съкратят времето за работа.
- Използвайте прах и течност върху блочекот. За отстраняване на замърсен слой се препоръчва CAVITY CONDITIONER или DENTIN CONDITIONER. За покритване на пуптата, използвайте калциев хидроксид.
- Използвайте прах и течност върху блочекот. За отстраняване на замърсен слой се препоръчва CAVITY CONDITIONER или DENTIN CONDITIONER. За покритване на пуптата, използвайте калциев хидроксид.
- Използвайте прах и течност върху блочекот. За отстраняване на замърсен слой се препоръчва CAVITY CONDITIONER или DENTIN CONDITIONER. За покритване на пуптата, използвайте калциев хидроксид.
- Използвайте прах и течност върху блочекот. За отстраняване на замърсен слой се препоръчва CAVITY CONDITIONER или DENTIN CONDITIONER. За покритване на пуптата, използвайте калциев хидроксид.
- Използвайте прах и течност върху блочекот. За отстраняване на замърсен слой се препоръчва CAVITY CONDITIONER или DENTIN CONDITIONER. За покритване на пуптата, използвайте калциев хидроксид.
- Използвайте прах и течност върху блочекот. За отстраняване на замърсен слой се препоръчва CAVITY CONDITIONER или DENTIN CONDITIONER. За покритване на пуптата, използвайте калциев хидроксид.
- Използвайте прах и течност върху блочекот. За отстраняване на замърсен слой се препоръчва CAVITY CONDITIONER или DENTIN CONDITIONER. За покритване на пуптата, използвайте калциев хидроксид.
- Използвайте прах и течност върху блочекот. За отстраняване на замърсен слой се препоръчва CAVITY CONDITIONER или DENTIN CONDITIONER. За покритване на пуптата, използвайте калциев хидроксид.
- Използвайте прах и течност върху блочекот. За отстраняване на замърсен слой се препоръчва CAVITY CONDITIONER или DENTIN CONDITIONER. За покритване на пуптата, използвайте калциев хидроксид.
- Използвайте прах и течност върху блочекот. За отстраняване на замърсен слой се препоръчва CAVITY CONDITIONER или DENTIN CONDITIONER. За покритване на пуптата, използвайте калциев хидроксид.

Ако слою е по-дебел от 1.6 мм, използвайте послойна техника.
а) Продължете със стандартните възстановителни техники за композит или амалгам.

СЪХРАНЕНИЕ

За оптимално представяне се препоръчва, съхранявайте на хладно и тъмно място (4-25°C / 39-77°F).

ОПАКОВКИ

- Шишенце с 10 g прах с мерителна лъжичка.
- Бутилка с 8 g (6.8 mL) течност.
- 1-1 опақ.: 10 g прах, 8 g (6.8 mL) течност, мерителна лъжичка, пластмасова шпатула, смесително блочек.

ВНИМАНИЕ

- В случай на контакт с оранлите тъкани или кожата, премахнете веднага с памперс туппер намокнен в алкохол. Промийте с вода.
- В случай на контакт с очите, промийте веднага с вода и потърсете медицинска помощ.
- НЕ СМЕСЯВАЙТЕ праха и течността с други глас-иономерни компоненти.
- Лични предпазни средства (ППЕ) като ръкавици, маски и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.
- В редки случаи, продуктът може да предизвика сърчевестивност у някои хора. При такива реакции, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност, налични на <https://www.gc.dental/europe>

Те също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ПОЧИТАВАНЕ И ДЕЗИНФИКАЦИЯ
ДОЗИРАЩИТЕ СИСТЕМИ ЗА ИНОСКОПНАТА УПОТРЕБА: за да се избегне кръвоконтаминия между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.

Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влашаване на устройството. Избягвайте употребата на този продукт, ако е увредено. НЕ ОБЛИВАЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотврати насякване и натрупване на замърсител. Деинфекцирайте с продукт за контрол на инфекцията според указанията за регистрацията за здравни чисти, в зависимост от регионалните / националните указания.

За Резюме на безопасността и клиничното представяне (SSCP), моля, вижте базата данни EUADAMED (<https://ec.europa.eu/tools/euadamed/>) или се свържете с нас на Regulatory.gce@gc.dental

Докладване на нежелани ефекти:
Ако узнаете за какъвто и да е нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали от употребата на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез съответната система за бдителност, която избере подходящите органи във вашата страна достъпна чрез следния връзка:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en както и на нашата система за вътрешна бдителност: vigilance@gc.dental По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция: 11/2024

GC Fuji LINING™ LC

RADIOPAKNI SVĚTLĚM TĚMNOUOI SKLOIONOMERNÍ PODLOŽKOVÝ CEMENT

Určeno výhradně k použití ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

INDIKACE K POUŽITÍ

Kaťo podloga ili premaz u prepariranih kavitetah.

KONTRAINDIKACE

- Prímé pokrývání pulpy.
- Nežádoucíte tento produkt u pacientů se známou alergií na skloionomerní cement, metakrylátový monomér nebo metakrylátový polymér.

SLOŽENÍ

Prášek: Fluor-hlinito-křemítké sklo, iniciátor, pigment
Tekutina: Metakrylát, voda, kyselina polyakrylová, dimethakrylát, karboxylová kyselina, iniciátor, stabilizátor

ŇÁVOD K POUŽITÍ

Prášek / tekutina poměr (g/g)	1.4 / 1.0
Míchací čas (sek.)	15"-25"
Pracovní čas (23°C/73°F) (min., sek.)	3'00"
Vřeme za svřtlení polymerizace (sek.)	30"
Hloubka osvřtlení (mm)	1.6

ISO 9917-2 Křas 2, Baza ili podloga
Radioopacka

1. DÁVKOVÁNÍ PRÁŠKU A TEKUTINY

- Standardní poměr prášku a tekutiny je 1,4 g/1,0 g. 1 lžička prášku na 1 kapku tekutiny.
- Pro přesné odměření prášku lehce proklepte lahvičku proti ruce. Neprotřepávejte lahvičku.
- Držte lahvičku s tekutinou vertikálně a lehce stiskněte.
- Uzavřete pevně lahvičky ihned po použití.

2. MÍŠENÍ

Nadkvěte požadované množství prášku a tekutiny na podložku. Míchacímotnou špatlíkou rozdělte prášek na dvě stejné části. Míchejte první porci s celým množstvím tekutiny po dobu 5-10 sekund. Potom přidejte zbyvajcí část prášku a celk důkladně promíchejte.

3. TECHNIKA VÝPLNĚ

- Průprarejte zub, používající standardní techniky. Další mechanická retence není nutná.
- Průprarejte zub, používající standardní techniky. Další mechanická retence není nutná.
- Průprarejte zub, používající standardní techniky. Další mechanická retence není nutná.
- Průprarejte zub, používající standardní techniky. Další mechanická retence není nutná.
- Průprarejte zub, používající standardní techniky. Další mechanická retence není nutná.
- Průprarejte zub, používající standardní techniky. Další mechanická retence není nutná.
- Průprarejte zub, používající standardní techniky. Další mechanická retence není nutná.
- Průprarejte zub, používající standardní techniky. Další mechanická retence není nutná.
- Průprarejte zub, používající standardní techniky. Další mechanická retence není nutná.
- Průprarejte zub, používající standardní techniky. Další mechanická retence není nutná.
- Průprarejte zub, používající standardní techniky. Další mechanická retence není nutná.
- Průprarejte zub, používající standardní techniky. Další mechanická retence není nutná.
- Průprarejte zub, používající standardní techniky. Další mechanická retence není nutná.
- Průprarejte zub, používající standardní techniky. Další mechanická retence není nutná.
- Průprarejte zub, používající standardní techniky. Další mechanická retence není nutná.

Jestliže vrstva cementu přesahuje hloubku 1,6 mm, použijte techniku vrstvení.

a) Pokračujte standardním kompozitem nebo amalgámovým vyplňovým materiálem.
b) Pokračujte standardním kompozitem nebo amalgámovým vyplňovým materiálem.

Ако слою е по-дебел от 1.6 мм, използвайте послойна техника.
а) Продължете със стандартните възстановителни техники за композит или амалгам.

СЪХРАНЕНИЕ

За оптимално представяне се препоръчва, съхранявайте на хладно и тъмно място (4-25°C / 39-77°F).

ОПАКОВКИ

- Шишенце с 10 g прах с мерителна лъжичка.
- Бутилка с 8 g (6.8 mL) течност.
- 1-1 опақ.: 10 g прах, 8 g (6.8 mL) течност, мерителна лъжичка, пластмасова шпатула, смесително блочек.

ВНИМАНИЕ

- В случай на контакт с оранлите тъкани или кожата, премахнете веднага с памперс туппер намокнен в алкохол. Промийте с вода.
- В случай на контакт с очите, промийте веднага с вода и потърсете медицинска помощ.
- НЕ СМЕСЯВАЙТЕ праха и течността с други глас-иономерни компоненти.
- Лични предпазни средства (ППЕ) като ръкавици, маски и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.
- В редки случаи, продуктът може да предизвика сърчевестивност у някои хора. При такива реакции, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност, налични на <https://www.gc.dental/europe>

Те също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ПОЧИТАВАНЕ И ДЕЗИНФИКАЦИЯ
ДОЗИРАЩИТЕ СИСТЕМИ ЗА ИНОСКОПНАТА УПОТРЕБА: за да се избегне кръвоконтаминия между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.

Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влашаване на устройството. Избягвайте употребата на този продукт, ако е увредено. НЕ ОБЛИВАЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотврати насякване и натрупване на замърсител. Деинфекцирайте с продукт за контрол на инфекцията според указанията за регистрацията за здравни чисти, в зависимост от регионалните / националните указания.

За Резюме на безопасността и клиничното представяне (SSCP), моля, вижте базата данни EUADAMED (<https://ec.europa.eu/tools/euadamed/>) или се свържете с нас на Regulatory.gce@gc.dental

Докладване на нежелани ефекти:
Ако узнаете за какъвто и да е нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали от употребата на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез съответната система за бдителност, която избере подходящите органи във вашата страна достъпна чрез следния връзка:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en както и на нашата система за вътрешна бдителност: vigilance@gc.dental По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция: 11/2024

GC Fuji LINING™ LC

SVĚTLOSNOPOLMERIZIRAJUCÍ STAKLEIONOMERNÍ PODLOŽKOVÝ CEMENT

Samo za stručnu dentalnu uporabu u indikacijama za uporabu.

INDIKACIJE ZA UPORABU

Kao podloga ili premaz u prepariranim kavitetima.

KONTRAINDIKACIJE

- Direktno prekrivanje pulpe.
- Neželićuje ovaj proizvod kod pacijenata s poznatim alergijama na skloionomernie cemente, metakrilatni monomer ili metakrilatni polimer.

SASTAV

Prášek: Fluoro-alumino-silikatno staklo, iniciator, pigment
Tekućina: Metakrilát, voda, poliakrilna kiselina, dimetakrilát, karbonska kiselina, inicijator, stabilizator

UPUTE ZA UPORABU

Omjer praška / tekućine (g/g)	1.4 / 1.0
Vrijeme miješanja (sek.)	15"-25"
Vrijeme rada (23°C/73°F) (min,sek.)	3'00"
Vrijeme svjetlosne polimerizacije	30"
Dubina stvrdnjavanja (mm)	1.6

ISO 9917-2 Klasa 2, Podložka ili podloga
Radioopozorno

1. DOZIRANJE PRÁŠKA I TEKUCINE

- Standardni omjer práška i tekućine iznosi 1.4 g/1.0 g, što odgovara jednoj kapci praška na jednu kapku tekućine.
- Ja precizno doziranje práška, leko poklepkajte lahvičku proti ruci. Ne smije se tresiti ili preokretati.
- Boćicu s tekucinom držati okomito i nježno je pritiskati.
- Odmah nakon uporabe boćice zatvoriti.

2. MIEŠANJE

Nadkvěte požadovanu količinu práška i tekućine staviti na podlogu za miješanje. Plastičnom žlicom prášek podijeliti u dva jednaka dijela. Prvi dio práška miješati 5-10 sekundi s cijelom količinom tekućine. Dodati ostatak práška i celk důkladně promíchejti.

3. TECHNIKA VÝPLNĚ

- Průprarejte zub na uboćivání náčin. Nije potrebna velika mehanická retenция.
- Isprati i osušiti zub ali NE PRESUSUŠITI. Za uklanjene zaošlosti prijevog sloja s dentin preporuca se rabiti CAVITY CONDITIONER ili DENTIN CONDITIONER. Pulpu zaštititi kalcijskim hidroksidom.
- Smesati potrebnu količinu cementa. Vrijeme rada iznos 3 minute od početka miješanja pri temperaturi od 23°C. Vise temperature skratit će vrijeme rada.
- Isprati i osušiti zub ali NE PRESUSUŠITI. Za uklanjene zaošlosti prijevog sloja s dentin preporuca se rabiti CAVITY CONDITIONER ili DENTIN CONDITIONER. Pulpu zaštititi kalcijskim hidroksidom.
- Smesati potrebnu količinu cementa. Vrijeme rada iznos 3 minute od početka miješanja pri temperaturi od 23°C. Vise temperature skratit će vrijeme rada.
- Isprati i osušiti zub ali NE PRESUSUŠITI. Za uklanjene zaošlosti prijevog sloja s dentin preporuca se rabiti CAVITY CONDITIONER ili DENTIN CONDITIONER. Pulpu zaštititi kalcijskim hidroksidom.
- Smesati potrebnu količinu cementa. Vrijeme rada iznos 3 minute od početka miješanja pri temperaturi od 23°C. Vise temperature skratit će vrijeme rada.
- Isprati i osušiti zub ali NE PRESUSUŠITI. Za uklanjene zaošlosti prijevog sloja s dentin preporuca se rabiti CAVITY CONDITIONER ili DENTIN CONDITIONER. Pulpu zaštititi kalcijskim hidroksidom.
- Smesati potrebnu količinu cementa. Vrijeme rada iznos 3 minute od početka miješanja pri temperaturi od 23°C. Vise temperature skratit će vrijeme rada.
- Isprati i osušiti zub ali NE PRESUSUŠITI. Za uklanjene zaošlosti prijevog sloja s dentin preporuca se rabiti CAVITY CONDITIONER ili DENTIN CONDITIONER. Pulpu zaštititi kalcijskim hidroksidom.
- Smesati potrebnu količinu cementa. Vrijeme rada iznos 3 minute od početka miješanja pri temperaturi od 23°C. Vise temperature skratit će vrijeme rada.
- Isprati i osušiti zub ali NE PRESUSUŠITI. Za uklanjene zaošlosti prijevog sloja s dentin preporuca se rabiti CAVITY CONDITIONER ili DENTIN CONDITIONER. Pulpu zaštititi kalcijskim hidroksidom.
- Smesati potrebnu količinu cementa. Vrijeme rada iznos 3 minute od početka miješanja pri temperaturi od 23°C. Vise temperature skratit će vrijeme rada.
- Isprati i osušiti zub ali NE PRESUSUŠITI. Za uklanjene zaošlosti prijevog sloja s dentin preporuca se rabiti CAVITY CONDITIONER ili DENTIN CONDITIONER. Pulpu zaštititi kalcijskim hidroksidom.
- Smesati potrebnu količinu cementa. Vrijeme

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.



GC Fuji LINING™ LC

RADIOOPÁKNY SVETLOM TUHNÚCI SKLOIONOMERNÝ PODLOŽKOVÝ CEMENT

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

INDIKÁCIE PRE POUŽITIE

Ako baza alebo podložka do preparovaných kavit.

KONTRAINDIKÁCIE

- Príame prekrývanie pulpy.
- Nepoužívajte tento produkt u pacientov so známou alergiou na skloionomerný cement, metakrylátový monomér alebo metakrylátový polymér.

ZLOŽENIE

Prášok: Fluór-hinito-silikátové sklo, iniciátor, pigment
Tekočina: Metakrylát, voda, kyselina polyakrylová, dimetakrylát, kyselina karboxylová, iniciátor, stabilizátor

NAVODILA NA POUŽITIE

Prášok / tekutina pomer (g/g)	1,4 / 1,0
Miešací čas (sek.)	15"-25"
Pracovný čas (23°C/73°F) (min., sek.)	3'00"
Čas osvetlenia (sek.)	30"
Hĺbka osvetlenia (mm)	1,6

ISO 9917-2 Triedy 2, Baza alebo podložka

Rádioopákné

1. DÁVKOVANIE PRAŠKU A TEKUTINY

- Standardný pomer prášku a tekutiny je 1,4 g / 1,0 g. Jedna zarovnaná odmerka na prášok na jednu kvapku tekutiny.
- Na presné dávkovanie prášku zľahka poklepte rukou po fľaštičke. Netrasťe a neobracujte ju.
- Drzte fľaštičku s tekutinou vertikálne a zľahka stlačte.
- Fľaštičku ihneď po použití uzavrite.

2. MIEŠANIE

Odmerané množstvo prášku a tekutiny dajte na podložku. Prášok rozdeľte plastovou špatkou na dva rovnaké diely.

Prvu dávku prášku a celé množstvo tekutiny miešajte 5–10 sekúnd. Pridajte zvyšnú dávku prášku a všetko dokopy miešajte 10–15 sekúnd.

3. TECHNIKA VYPLNENIA

- Zub preparujte pomocou štandardných techník. Nie je nutná rozsiahla mechanická retencia.
- Umyte a osušte, ale NEPRESUŠUJTE. Na odstránenie zvyškov silných vrstiev (semer layer) odporúčame CAVITY CONDITIONER alebo DENTIN CONDITIONER. Na prekrýtie pulpy použite hydroxid vápenný.

- Namiešajte potrebné množstvo cementu. Pracovný čas je 3 minúty od začiatku miešania pri 23°C (73°F). Pri vyšších teplotách sa pracovný čas skracuje.
- Odstráňte viskóznú zvrstvu, ale NEPRESUŠUJTE.

- Cement striekajte alebo vhodným nástrojom naneste do kavity a pokryte nim dentín až po spojenie dentínu a skloviny.
- Vytvrdzujte svetlom po dobu 30 sekúnd pomocou polymerizačnej lampy (LED / halogén >700 mW/cm²). Zdroj svetla umiestnite čo najbližšie k povrchu cementu.

- Poznámka: Ak je vrstva cementu hlbšia ako 1,6 mm, použite tekutinu vrstvenia.
- Pokračujte spôsobom bežným pre kompozitné alebo amalgámové vplně.

USKLADNENIE

Pre zachovanie optimálnych fyzikálnych vlastností, skladujte na chladnom a tmavom mieste (4-25°C / 39-77°F).

BALENIE

- Fľaštička s 10 g prášku a odmerka.
- Fľaštička s 8 g (6,8 mL) tekutiny.
- Balenie 1+1 Pack: 10 g prášku, 8 g (6,8 mL) tekutiny, odmerka na prášok, plastová fľaštička, miešacie podložky.

UPOZORNENIE

- V prípade zasiahnutia ústnej sliznice alebo pokožky ihneď odstráňte kúsok vaty, gázu alebo hubku namočenou v alkohole. Opíchnite vodou.
- V prípade zasiahnutia očí ihneď vypláchnite vodou a vyhľadajte pomoc lekára.
- Prášok ani tekutinu NEMIEŠAJTE s komponentami iných skloionomerných cementov.
- Vždy používajte ochrannú pomôcku ako rukavice, masku a ochranný kryt očí.
- V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.

Niektoré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozrňte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese:

<https://www.gc.dental/europe>

Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKČIA: DÁVKOVACIE SYSTÉMY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE:

aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientami vyžadujúci tieto dávkovacie systémy strednú - úroveň dezinfekcie. Ihneď po použití skontrolujte, či nie je dávkovací systém a štitok poškodený. V prípade poškodenia, ho ihneď zlikvidujte.

NE POKUŠAJTE OD TUKUTIN. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa zabránilo vysychaniu a hromadeniu nečistôt. Dezinfekciu s registrovanými dezinfekčnými prostriedkami na strednú úroveň dezinfekcie v závislosti na regionálnych / národných smerniciach.

Súdrž bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) nájdete v databáze EUADAMED (<https://ec.europa.eu/tools/euadamed>) alebo nás kontaktujte na adrese Regulatory.gcc@dc.dental

Hlásenie nežiadúcich účinkov: Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku, informujte nás o tomto udaní na adrese info@kristar.ua alebo nás kontaktujte na adrese info@kristar.ua

Naše nariadenia účinných: Ako sa Vám vyskytnú účinné nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku, informujte nás o tomto udaní na adrese info@kristar.ua alebo nás kontaktujte na adrese info@kristar.ua

Naše nariadenia účinných: Ako sa Vám vyskytnú účinné nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku, informujte nás o tomto udaní na adrese info@kristar.ua alebo nás kontaktujte na adrese info@kristar.ua

Naše nariadenia účinných: Ako sa Vám vyskytnú účinné nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku, informujte nás o tomto udaní na adrese info@kristar.ua alebo nás kontaktujte na adrese info@kristar.ua

Naše nariadenia účinných: Ako sa Vám vyskytnú účinné nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku, informujte nás o tomto udaní na adrese info@kristar.ua alebo nás kontaktujte na adrese info@kristar.ua

Naše nariadenia účinných: Ako sa Vám vyskytnú účinné nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku, informujte nás o tomto udaní na adrese info@kristar.ua alebo nás kontaktujte na adrese info@kristar.ua

Naše nariadenia účinných: Ako sa Vám vyskytnú účinné nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku, informujte nás o tomto udaní na adrese info@kristar.ua alebo nás kontaktujte na adrese info@kristar.ua

Naše nariadenia účinných: Ako sa Vám vyskytnú účinné nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku, informujte nás o tomto udaní na adrese info@kristar.ua alebo nás kontaktujte na adrese info@kristar.ua

Naše nariadenia účinných: Ako sa Vám vyskytnú účinné nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku, informujte nás o tomto udaní na adrese info@kristar.ua alebo nás kontaktujte na adrese info@kristar.ua

Naše nariadenia účinných: Ako sa Vám vyskytnú účinné nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku, informujte nás o tomto udaní na adrese info@kristar.ua alebo nás kontaktujte na adrese info@kristar.ua

GC Fuji LINING™ LC

RADIOOPÁČEN SVETLOBNÓ STRUJÚCÍ STEKLASTI IONOMER ZA PODLAGANJE

Samo za profesionálnu dentálnu uporabo.

INDIKACIJE ZA UPORABO

Kot osnova ali podloga v kavitetah.

KONTRAINDIKACIJE

- Direktna krpa pulpe.
- Ne uporabljajte tega izdelka pri pacientih z znano alergijo na skloionomerné cemente, metakrylátové monomere ali metakrylátové polymere.

SESTAVA

Praň: Fluor-alumino-silikátové sklo, iniciátor, pigment
Tekočina: Metakrílát, voda, poliakrílna kyselina, dimetakrílát, karboksílna kyselina, iniciátor, stabilizátor

NAVODILA ZA UPORABO

Praň / tekočí rozmerje (g/g)	1,4 / 1,0
Čas mešanja (sek.)	15"-25"
Delovni čas (23°C/73°F) (min., sek.)	3'00"
Čas svetlobného osvetľovania (sek.)	30"
Gĺbina polymerizácie (mm)	1,6

ISO 9917-2 Razred 2, Baza ali podloga

Rádioopázen

1. DOZIRANJE PRAHU I TEKOCINE

- Standardné rozmery praň/tekočína je 1,4 g/1,0 g. Ena polna žlica praňu in ena kapka tekočína.
- Na presné dávkovanie praňu zľahka poklepte rukou po fľaštičke. Netrasťe a neobracujte ju.
- Drzte fľaštičku s tekutinou vertikálne in nežno stisnite.
- Fľaštičku ihneď po použití uzavrite.

2. MIEŠANJE

Razdeľte praň in tekočína na mešálnu podlogu. Uporabljajte plastíčno lopatíco in razdeľte praň na dva enaka díely. Mešajte prví díel z vso tekočína za 5-10 sekúnd. Vključíte se ostalí díel z mešálne celoto za 10 - 15 sekúnd.

Prvu dávku praňu a celé množstvo tekočína mešajte 5–10 sekúnd. Pridajte zvyšnú dávku praňu a všetko dokopy mešajte 10–15 sekúnd.

3. RESTAVRAČIJSKA TECHNIKA

- Pripravte zub za upotrebljanje standardne tehnike. Oščiřne mehaniske retencíe niso potrebne.
- Operite in osušite AMPAK NE IZSUŠITE, CAVITY CONDITIONER ali DENTIN CONDITIONER. Na prekríťje pulpe uporabite kalcíjev hidroksí.

- Zmešajte potrebno količinu cementa. Delovni čas je 3 minute od začetka mešanja pri 23°C. Višje temperature bo zmanjšala delovni čas.
- Odstranite vlago na površini AMPAK NE IZSUŠITE.

- Dodajte cement k oščiřeni in uporabljajte brižgalo ali drug primeren instrument. Pokríťje dentín do roba sklesí.
- Svetlobno polymerizacijo 30 sekúnd z uporabo polymerizacijske lučke (LED / halogén >700 mW/cm²). Postavite vir svetlobe kolikor je mogoče blizu k cementni površini.

- Poznámka: Če je vrstva cementa hlbša kot 1,6 mm, uporabite slojno tehniko.
- Nadaljujte izdelavo restavracíe s standardnim kompozíom ali amalgamom.

POKRAJITE SPOSOBOM BEŽNIM PRE KOMPOZITNE ALBO AMALGÁMOVÉ VPLNJE.

Uskladeníe: Za optimálne lastnosti, shranjujte v hladnem in temnem prostoru (4-25°C / 39-77°F).

BALENIJE

- Fľaštička s 10 g praňu in žličko.
- Steklenica s 8 g (6,8 mL) tekočína.
- 1+1 pkg: 10 g praňu, 8 g (6,8 mL) tekočína, žlička za praň, plastíčna lopatíca, in mešálna podloga.

OPOROZORILO

- V primeru stíka z užšnim tkívom ali kožo, nemudoma odstraníte z gobo ali bombažno krpo prepojeno z alkoholom. Izplaknite z vodo.
- V primeru stíka z očmi, nemudoma izplaknite z vodo in poiščite medicínsko pomôč.
- NE mešajte praňu ali tekočína z drugimi sestavinami.
- Osebná varovalna oprema kot so rokavíce, obrabna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati.
- V redkih primerih lahko izdelek povzroči občutljivost pri nekatérh ljudeh. Če pride to takšnih reakcí, prenehajte z uporabo izdelka in se obrnite na zdravníka.

Nekatéri proizvoďi omejení v predhodnih navodíľh za uporabo so lahko klasíficírovani kot nevarní glede na GHS. Vedno se poďúťite o navodíľh za varno uporabo na: <https://www.gc.dental/europe>

Lahko pa jih dobíte tudi pri vašem zastopníku.

ČIŠČENJE I DEZINFEKČIA: SYSTÉM ZA VEČKRATNO UPORABO:

aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientami vyžadujúci tieto dávkovacie systémy strednú - úroveň dezinfekcie. Ihneď po použití skontrolujte, či nie je dávkovací systém a štitok poškodený. V prípade poškodenia, ho ihneď zlikvidujte.

NE POKUŠAJTE V TEKOCE SREDSTVO ZA DEZINFEKČIU. Temelíto očistíte systém za večkrate uporabo, da preprečíte sušenie in nabírání nečistôt. Dezinfíkcíe je s redstvom za dezinfekcíu strednej úrovne, registrovaného dezinfíkcíjného prostriedku na strednú úroveň dezinfekcíe v závislosti na regionálnych / národných smernícach.

Na pozvetek varnosti in klínického účínku (Summary of Safety and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bázu podataka EUADAMED (<https://ec.europa.eu/tools/euadamed>) ali nás kontaktíťte na Regulatory.gcc@dc.dental

Hláseníe neželáných účínků: Ak se zavadeťe kakršných koli neželáných účínků, reakcí ali podobných dogodkov, do kavičíte se pršío pri uporabi tega izdelka, vključno s tístimi, ki niso navedení v tem navodíľu za upotrebu, informujte nás o íh prijavitíe dírektno kroz odgovarjací systém nadzora, ali kot túdi v našem systéme notranjega nadzora: vigilance@gcc.dental

Na našo náčin dostípišete íboljšanjí signurnosti tega izdelka.

Zadníja ídizja: 11/2024

Naposledy upravené: 11/2024

GC Fuji LINING™ LC

RENTGENKONTRASTAN SVETLOSNO POLIMERIZUJÚCI GLASJONOMER CEMENT ZA PODLOGE

Samo za stručno stomatološku upotrebu v indikacijama za upotrebu.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

Kao podloga ili premaz u preparisanim kavitetima.

KONTRAINDIKACIJE

- Direktno krpa pulpe.
- Izbegavati upotrebu ovog proizvoda kod pacijenata sa poznatom alergijom na glasionomere cemente, metakrilatne monomere ili metakrilatne polymere.

SASTAV

Praň: Fluor-alumino-silikatno sklo, iniciator, pigment
Tekoćina: Metakrilat, voda, poliakrilna kiselina, dimetakrilat, karboksilna kiselina, i cijicator, stabilizator

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

odnos praňa i tekoćnosti (g/g)	1,4 / 1,0
Vreme mešanja (sek.)	15"-25"
Radno vreme (23°C/73°F) (min,sek.)	3'00"
Vreme svetlosne polymerizacije (sek.)	30"
Dubina stvrdnjavanja (mm)	1,6

ISO 9917-2 Klasa 2, Base or lining

Rentgenska vidljivost

1. DOZIRANJE PRAHA I TEKOCINE

- Standardni odnos praňa i tekoćnosti iznosi 1,4 g/1,0 g, što odgovara jednoj kašici praňa na jednu kvapku tekoćine.
- Na tačno doziranje praňa boćicom lagano lupkati o ruku. Ne sme da se tresie i prevrće.
- Boćicu sa tekoćnoću držati uspravno i nežno je pritisakati.
- Odmah posle upotrebe boćice zatvoriti.

2. MEŠANJE

Razdeľite praň in tekoćína na mešálnu podlogu. Uporabljajte plastíčno lopatíco in razdeľite praň na dva enaka díely. Mešajte prví díel z vso tekoćína za 5-10 sekúnd. Vključíte se ostalí díel z mešálne celoto za 10 - 15 sekúnd.

Prvu dávku praňu a celé množstvo tekoćína mešajte 5–10 sekúnd. Pridajte zvyšnú dávku praňu a všetko dokopy mešajte 10–15 sekúnd.

3. RESTAVRAČIJSKA TECHNIKA

- Pripravte zub za upotrebljanje standardne tehnike. Oščiřne mehaniske retencíe niso potrebne.
- Operite in osušite AMPAK NE IZSUŠITE, CAVITY CONDITIONER ali DENTIN CONDITIONER. Na prekríťje pulpe uporabite kalcíjev hidroksí.

- Zmešajte potrebno količinu cementa. Radno vreme iznosi 3 minute od početka mešanja pri temperaturi od 23°C. Više temperature skraćite radno vreme.
- Odstranite vlago na površini AMPAK NE IZSUŠITE.

- Dodajte cement k oščiřeni in uporabljajte brižgalo ali drug primeren instrument. Pokríťje dentín do roba sklesí.
- Svetlobno polymerizaciju 30 sekúnd z uporabo polymerizacijske lučke (LED / halogén >700 mW/cm²). Postavite vir svetlobe kolikor je mogoče blizu k cementni površini.

- Poznámka: Če je vrstva cementa hlbša kot 1,6 mm, uporabite slojno tehniko.
- Nadaljujte izdelavo restavracíe s standardnim kompozíom ali amalgamom.

POKRAJITE SPOSOBOM BEŽNIM PRE KOMPOZITNE ALBO AMALGÁMOVÉ VPLNJE.

Uskladeníe: Za optimálne lastnosti, shranjujte v hladnem in temnem prostoru (4-25°C / 39-77°F).

BALENIJE

- Fľaštička s 10 g praňu in žličko.
- Steklenica s 8 g (6,8 mL) tekočína.
- 1+1 pkg: 10 g praňu, 8 g (6,8 mL) tekočína, žlička za praň, plastíčna lopatíca, in mešálna podloga.

OPOROZORILO

- V primeru stíka z užšnim tkívom ali kožo, nemudoma odstraníte z gobo ali bombažno krpo prepojeno z alkoholom. Izplaknite z vodo.
- V primeru stíka z očmi, nemudoma izplaknite z vodo in poiščite medicínsko pomôč.
- NE mešajte praňu ali tekočína z drugimi sestavinami.
- Osebná varovalna oprema kot so rokavíce, obrabna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati.
- V redkih primerih lahko izdelek povzroči občutljivost pri nekatérh ljudeh. Če pride to takšnih reakcí, prenehajte z uporabo izdelka in se obrnite na zdravníka.

Nekatéri proizvoďi omejení v predhodnih navodíľh za uporabo so lahko klasíficírovani kot nevarní glede na GHS. Vedno se poďúťite o navodíľh za varno uporabo na: <https://www.gc.dental/europe>

Lahko pa jih dobíte tudi pri vašem zastopníku.

ČIŠČENJE I DEZINFEKČIA: SYSTÉM ZA VEČKRATNO UPORABO:

aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientami vyžadujúci tieto dávkovacie systémy strednú - úroveň dezinfekcie. Ihneď po použití skontrolujte, či nie je dávkovací systém a štitok poškodený. V prípade poškodenia, ho ihneď zlikvidujte.

NE NAMAKUJTE V TEKOCE SREDSTVO ZA DEZINFEKČIU. Temelíto očistíte systém za večkrate uporabo, da preprečíte sušenie in nabírání nečistôt. Dezinfíkcíe je s redstvom za dezinfekcíu strednej úrovne prema registrovaného dezinfíkcíjného prostriedku na strednú úroveň dezinfekcíe v závislosti na regionálnych / národných smernícach.

Na pozvetek varnosti in klínického účínku (Summary of Safety and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bázu podataka EUADAMED (<https://ec.europa.eu/tools/euadamed>) ali nás kontaktíťte na Regulatory.gcc@dc.dental

Hláseníe neželáných účínků: Ak se zavadeťe kakršných koli neželáných účínků, reakcí ali podobných dogodkov, do kavičíte se pršío pri uporabi tega izdelka, vključno s tístimi, ki niso navedení v tem navodíľu za upotrebu, informujte nás o íh prijavitíe dírektno kroz odgovarjací systém nadzora, ali kot túdi v našem systéme notranjega nadzora: vigilance@gcc.dental

Na našo náčin dostípišete íboljšanjí signurnosti tega izdelka.

Zadníja ídizja: 11/2024

Naposledy revíziá: 11/2024

GC Fuji LINING™ LC

ДЖІСІ ФУДЖІ ЛАІНІНГ™ ЕНСІ

РЕНТГЕНКОНТРАСТНИЙ СКЛОІОНОМЕРНИЙ ПРОКЛАДЧНИЙ ЦЕМЕНТ СВІТЛОБОЇ ПОЛІМЕРІЗАЦІЇ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

У якості бази або прокладку у відправлених порожнинах.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Пряме перекриття пульпи.
- Не використовуйте цей матеріал для пацієнтів з алергією на склоіомерні цементи, мономер метакрилату або полімер метакрилату.

САСТАВ

Прах: Флуор-алуміно-силікатне скло, ініціатор, пігмент
Рідина: Метакрилат, вода, поліакринова кислота, диметакрилат, карбонова кислота, ініціатор, стабілізатор

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Співвідношення порошку / рідини (r/r)	1,4 / 1,0
Час змішування (сек.)	15"-25"
Робочий час (23°C/73°F) (хв., сек.)	3'00"
Час світлової полімеризації (сек.)	30"
Глибина полімеризації (мм)	1,6

ISO 9917-2 Класу 2, Базис чи підкладка

Радіопрозорий

- ДОЗУВАННЯ ПОРОШКУ ТА РІДИНИ
- Стандартний відношення порошку / рідини складає 1,4 г/1,0 г. 1 мірна ложка порошку та 1 крапля рідини.
- Для точного дозування порошку злегка постукайте боковою стінкою посуду, в якому знаходиться порошок, нежно ударите штекером по штифту.
- Тримайте флашку вертикально та несильно стискайте.
- Закривайте флашку одразу ж після використання.

- МІШАННЯ
- Розділіть порошок на дві рівні частини за допомогою пластмасового шпателя. Змішуйте першу порцію порошку з усією рідиною протягом 5-10 секунд. Додайте частину порошку, що залишилася та змішайте весь матеріал ще протягом 10-15 секунд.
- Замішування