

Пред použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.

SK

GC Fuji™ I

RADIOOPÁKNY SKLOIONOMERNÝ FIXAČNÝ CEMENT

Na použitie len v stomatologických praxi v doporučených indikáciach.

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE

- Cementovanie všetkých typov kovových inlejší, onlejší, korúnok, mostíkov a čapov.
- Cementovanie všetkých korúnok a mostíkov vyrobených z keramiky s vysokou pevnosťou (na báze zirkónia).

KONTRAINDIKÁCIE

- Priame prekrytie pulpy.
- Tento výrobok nepoužívať u pacientov s preukázanou alergiou na skloionomerný cement.

NÁVOD NA POUŽITIE

Prášok/tekutínapomer(g/g)	1,8/1,0
Miešací čas (sek.)	20"
Pracovný čas (min., sek.) pri 23°C od začiatku miešania	2'00"
Začiatok konečného opracovania (po usadení náhrady)	4'30"

- PRIPRÁVA ZUBA**
 - Prípraviť zub bežným spôsobom. Na prekrytie pulpy použite hydroxid vápenatý.
 - Výčistite preparovaný zub pemzou a vodou.
 - Dôkladne opláchnite vodou. Prebytok vlhkosti vysušte vatovým tampónom alebo jemne vyfúkajte vzduchom. NEPEREŠSUŠAŤE. Preparovaný povrch by sa mal javiť vlhký (lesklý).
- PRIPRÁVA NÁHRADY**
 - Prípravok musí byť vyhotovená a predpripravená podľa inštrukcií výrobcu.
- DAVKOVANIE PRAŠKU A TEKUTINY**
 - štandardný pomer prášku a tekutiny je 1,8 g / 1,0 g - 1 lyžička prášku zmiešajte s tekutinou. Rýchlo miešajte po dobu 20 sekúnd.
 - Naprešné odmeranie prášku zľahka poklepte rukou po fľaštičke, neťraťte a neobracajte ju.
 - Držte fľaštičku v tekutinou vertikálne a zľahka stlačte.
 - Po použití fľaštičky dobre uzavrite.
- MIEŠANIE**

Nadávkujte prášok až tekutinu na podložku. Umelohmotnou špatulou zmiešajte s celým objemom tekutiny (5 sek.), potom pridajte druhú polovicu a miešajte 15 sekúnd (celkovo 20 sekúnd). Poznamka: Pri väčších dávkach rozdeľte prášok na dve rovnaké polovice, prvú polovicu zmiešajte s celým objemom tekutiny pri 23°C (73,4°F). Vyššie teplota začiatku miešania pri teplote 23°C (73,4°F). Vyššia teplota skracuje pracovný čas.
- Udržujte mierny tlak.
- Odstráňte prebytočný cement vo chvíli, keď je jeho konzistencia "gumovitá".
- Opracovanie môžete začať 4 minúty 30 sekúnd po usadení náhrady.

SKLADOVANIE
Pre zachovanie optimálnych vlastností je doporučené uložiť na chladnom a tmavom mieste (4 -25°C / 39,2-77,0°F).

ODTIEŇ

Balenie

Sealenie

- 1.-1 balenie: 35 g prášok, 25 g (20 ml) tekutina, lyžička na prášok, mešacia podložka (No. 20).
2. Fľaštička - prášok 35 g s lyžičkou.
3. Fľaštička - tekutina 25 g (20 ml).

UPOZORNENIE

- V prípade kontaktu s ústnou dutinou alebo kožu ihneď odstráňte špongiou alebo vatou namočenou v alkohole. Opláchnite vodou. Na ústnú dutinu odporúčame použiť koferdam alebo pokokyša sa môže použiť koferdam alebo kakaové maslo.
- V prípade kontaktu s očami ihneď vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Prášok alebo tekutinu nemešajte s inými skloionomernými cementami.
- Tento produkt je určený pre výplne alebo dostavby
- Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranný kryt očí.
- V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.

Niektoré výrobkyuvádzané v návode na použitie, môžu byť

Klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: <http://www.gecgroup.com> Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKČIA

DAVKOVACIE SYSTÉMY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientmi vyžadujú tieto dávkovacie systémy strednú - úroveň dezinfekcie. Ihneď po použití skontro lujte, či nie je dávkovací systém a šitkok poškodený. V prípade poškodenia ho ihneď zlikvidujte.

NEPONÁRAJTE DO TEKUTÍN. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa zabránilo vyzráchaniu a hromadeniu nečistôt. Dezinfikujte s registrovanými zdravotnými prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie v závislosti na regionálnych / národnýchsmerniciach.

Hlásenie nežiadúcich účinkov:

Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vigilance systém, zadaním správnej adyly Vašej krajiny, na nasledujúcom linku: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en ako aj na našom vnútornom systéme bdelsoti: vigilance@gc.dental Týmto spôsobom prispievate k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Naposledy upravené : 04/2021

GC Fuji™ I

RADIOOPÁKNÝ STEKLASTO IONOMERNÝ CEMENT ZA LEPLJENIE

Radiaopa samo za profesionálne namerie ni za priporočené indikácie.

PRIPORUČENÉ INDIKÁCIE

- Cementovanie kovových inlejší, onlejší, prevlek, mostíkovín a zatievč.
- Cementovanie močnín (zirkóniev)polno keramičnín prevlek in mostíkov.

KONTRAINDIKÁCIE

- Drobná knia pulpe.
- Zložigabte se uporabi tega proizvoda pri pacientih z znano alergiou na skloionomernoe cemente

NAVODILA ZA UPORABO

Razmerje prah i tekocina (gg)	1,8/1,0
Čas mešanja (sek.)	20"
Delovni čas (min., sek.) (pri 23°C) (od začetka mešanja)	2'00"
Pričetek časa za obdelovanje (ko se restavracija strdi)	4'30"

- PREPARACIJAZOBA**
 - zob pripravite na običajen način. Za zaščito pulpe uporabite kalcijske hidrokside.
 - Pripravljeni zob očistite s plovcem in vodo.
 - Išperite to vodom.Ukloňte višak tečnosti blagim mlazom pusterla ili lufomom vate.NE PERESUŠITE. Najbolji rezultat postizu se ako su preparirane površine još vlažne (svetlijačkaj). Preparovany povrch by sa mal javiť vlhký (lesklý).
- RESTAVIRANJE PREPARACIJE**

Restavraciju obravnajte u rukavice i u rokuje z njo v skladu z navodili proizvođača.
- RAZDELJEVANJE PRAHU I TEKUĆINO**
 - Standardno razmerje med prahom i tekućino je 1,8g/1,0g (1 zmravnja žlička prahu i 2 kapljici tekućine).
 - za pravilnije razdeljevanje prahu nežno udarite s stekleničko ob ruku. Ne stresaite je ali obraćajte.
 - Stekleničku s tekućino držite vertikalno i u nežno stisnite.
 - Stekleničku po končani uporabi takoj zaprite.
- MESANJE**

Prah i tekućino razdelite na mešalno podlogu. S pomoćju plastične spatule dodajte ves prah tekućini. Hitro mešajte 20 sekundi. Navodilo: Pri mešanju većih količin razdelite prah na dva enaka dela. Mešajte prvi deo praha sa celom tekućinom 5 sekundi. Sjedinite preostali prah i mešajte još 15 sekundi (ukupno 20 sekundi).
- CEMENTIRANJE**
 - Notranje površine restavracije prevlečite z zadostno količino cimenta i nakon nastave na knm.
 - Delovni čas mešanja s celim objemom tekutiny pri 23°C (73,4°F). Vyššie teplota skrajšajo delovni čas.
 - Vzdržujte zmerni pritisk.
 - Čišćenje odstranjivati viške cimenta, ko ti postanejo gumijasti.
 - S kočno obdelo lahko začnete 4 minute i 30 sekund po strdivi restavracije.

SHRANJEVANJE
Za optimalen rezultat priporočljivo shranjujte v hladnem i termem prostoru (4-25°C / 39,2-77,0°F).

BARVA

Sveflo rumena

PAKIRANJE

- 1.-1 paket: 35g prahu, 25g (20ml) tekućine, žlička za prah, mešalne podloge (No. 20).
2. Steklenička 35g prahu i žličko.
3. Steklenička s 25g (20ml) tekućine.

OPOROZILLO

- V primeru stika materiala s tkivi v ustni votlini ali s kožo ga takoj odstranite z gobo ali vato namočeno v alkoholu. Sperite z vodo. Za preprečevanje stikov lahko uporabite le koferdam in/ali izolirate operacijsko polje s pomočjo cocoa butter-a.
- V primeru stika z očmi, takoj sperite z vodo in poiščite pomoč zdravnika.
- NE mešajte prahu ali tekućine s komponentami drugih steklasto ionomernih cementov.
- Izdelek ni namenjen za polnjenje ali izgradnjo nosilca.
- Osoba bora valovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati
- V redkih primerih lahko izdelek pri nekaterih ljudeh povzroči preobčutljivost. V takem primeru prekinite z uporabo in napolnite pacienta k zdravniku.

Nekateri proizvojdci omenjeni v prethodnih navodilih za uporabo so lahko klasificirani kot nevarni glede na GHS. Vedno se poslužite o navodil za varno uporabo na: <http://www.gecgroup.com> Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

ČIŠČENJE I DEZINFEKCIJA: SISTEM ZA VEKTRATNO UPORABO: da se izognele navzkrizni kontaminaciji med pacientom i sistemom za vektratio uporabo, je zahtevana dezinfekcija srednjega nivoja. Takoj po uporabi preglejate sistem za vektratio uporabo in označite poškodbe če so le prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.

NE NAKAMAJTE V TEKOĆE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito očistite sistem za vektratio uporabo, da preprečite sušenje i nabiranje nečistoće. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcio srednjega nivoja, registriranega pri zdravstveno infektivni kontroli sklado z regionalno/lokalno regulativo.

Poročilo o neželenih učinkih: Če se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega sistema za stalni nadzor, tako da izberete ustrezen obraz v vaši državi dostopni preko naslednje povezave: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en ali na naši interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental

Na taj način boste poboljšali varnost ovog proizvoda. Posljednja revizija : 04/2021

Zadnja izdaja: 04/2021

GC Fuji™ I

RTG-VIDLJIV GLASJONOMER ZA CEMENTIRANJE

Samo za stručno stomatološko upotrebu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE

- Cementiranje inlejša, onlejša, krunica, mostova sa metalnom osnovom.
- Cementiranje vseh keramičnih krunica i mostova velike čvrstoće (na osnovi od zirkonijuma).

KONTRAINDIKACIJE

- Direktno prekrivanje pulpe.
- Izbegavajte upotrebu ovog proizvoda kod pacijenata sa poznatom alergijom na glasionomer cemente.

UPUTSTVOZA UPOTREBU

Odnos prah i tečnosti(g/g)	1,8/1,0
Vreme mešanja (sek)	20"
Vreme rada (min, sek)	2'00"
Vreme početka završne obrade (posle postavljanja protetskog rada)	4'30"

- PREPARACIJA ZUBA**
 - Pripremite zub uobičajenom tehnikom.Za prekrivanje pulpe koristite kalcijum-hidroksid.
 - Pripremljen zub isperite vodom.
 - Išperite to vodom.Uklonite višak tečnosti blagim mlazom pusterla ili lufomom vate.NE PERESUŠITE. Najbolji rezultat postizu se ako su preparirane površine još vlažne (svetlijačkaj).
- PRIPREMA PROTETSKOG RADA**

Provjerite da li je protetski rad urađen prema uputstvu proizvođača.
- RAZDELJEVANJE PRAHA I TEKUĆOSTI**
 - Standardni odnos praha i tečnosti je 1,8g/1,0g (1 ravna kašičica praha na dve kapi tečnosti).
 - za ravnomernu gustinu praha flišku lupite nežno o dlan.Ne tresite je i ne izvirite.
 - Držite flišku sa tečnošću vertikalno i lagano istiskajte.
 - Završite flišku odmah posle upotrebe.
- MESANJE**

Istisnite prah i tečnost na podlogu za mešanje. Koristite plastičnu spatulu dodajte sav prah i tečnost.Mešajte 20 sekundi. Navodilo: Pri mešanju većih količina razdelite prah u dva jednaka dela. Mešajte prvi deo praha sa celom tečnošću 5 sekundi. Sjedinite preostali prah i mešajte još 15 sekundi (ukupno 20 sekundi).
- CEMENTIRANJE**
 - Prekritje unutarnjih rana dovoljnom količinom cimenta i odmah ga postavite. Vreme rada je 2 minuta od početka mešanja na 23°C (73,4°F). Viza temperatura skraćuje vreme rada.
 - Držite pod odgovarajućim pritiskom.
 - Počnite da uklanjate višak cimenta kad postane gumast.
 - Završna obrada može da počne 4 minuta i 30 sekundi posle postavljanja protetskog rada.

ČUVANJE
Za optimalno korišćenje preporučuje se čuvati na hladnom i tamnom mestu (4-25°C / 39,2-77,0°F).

BOJA

Sveflo žuta

PAKOVANJE

- 1.-1-pkg: 35g praha, 25g (20ml) tečnosti, kašičica, podloga za mešanje (No. 20).
2. Fliška od 35g praha sa kašičicom.
3. Fliška od 25g (20ml) tečnosti.

UPOZORENJE

- U slučaju dodira sa kožom ili oralnim tkivima, odmah uklonite cement sudorom ili vatom umočenom u alkohol. Isperite vodom. Da biste sprečili kontakt cimenta, koži i desni možete da upotrebite koferdam ili GC Cocoa butter.
- U slučaju kontakta sa očima, odmah isperite vodom i potražite lekarsku pomoć.
- NE MEŠATI prašak i tečnost s drugim glasionomernim materijalima.
- Proizvod nije namenjen za ispunje ili izradu nadogradnji.
- Lična zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maske za lice i sigurnosna zaštitna za lice, treba uvek nositi.
- U redkim slučajevima proizvod može izazvati osetljivost kod nekih pacijenata. U tom slučaju prekinite upotrebu proizvoda i potražite pomoć lekara.

Neki proizvodi pomenuti u ovom Uputstvu za upotrebu mogu da se klasifikuju kao opasni prema GHS. Uvek proverite u sigurnosno tehničko listu na: <http://www.gecgroup.com> Takođe su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA: VIŠEKRATNO UPO TREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla kontaminacija izmeđi pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakovanja zahtevaju dezinfekciju srednjeg nivoa. Odmah posle upotrebe pregledajte višekratno upotrebljivo pakovanje i i označite oštećenja ako ih ima. Oštećenu upravu baciti.

NE URANJATI U TEĆNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljno očistite višekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje prljavštine.

Dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju srednjeg nivoa prema registrovanoj zdravstveno-infektivnoj kontroli u skladu sa regionalnoj/ nacionalnim smernicama.

Obaveštavanje o neželenim dejstvima: Ako postarate ovesni bilo kakvih neželenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, odoabom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće veze: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en kao i na naši interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental

Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda. Posljednja revizija : 04/2021

GC Fuji™ I

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ СКЛОИОМЕРНИЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

Для використання тільки лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ

- Фіксація металевих, крон, куль, ілun tapu цементів.на металевому каркасі та металевих штифтів.
- Фіксація керамічних коронок та мостів на каркасі підвищеної міцності (оксид цирконію).

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Прямє перекриття пульпи.
- Не використовувати для пацієнтів з підтвердженою алергією на склоіомерні цементи

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Співвідношення порошok/ рідинa (r/r)	1,8/1,0
Час замішування (сек.)	2'00"
Робочий час (хв., сек.)	20"
Час затвердіння 23° С) (від початку замішування)	2'00"

(при температурі 23° С) (від початку замішування)

- ПІДГОТОВКАЗУБУ**
 - Відпрепаруйте зуб, застосовуючи традиційну методику. Для перекриття пульпи використовуйте матеріали на основі гідроксиду кальцію.
 - Очистіть відпрепаровані зуби з допомогою пенки та води.
 - Ретельно промийте зуб водою. Виділіть надлишки вологоти, промокуючи ватним тампоном або просушивши повітрям без димок масла під невеликим тиском. НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ.

Поверхня зуба повина виглядати вологою (блискато).

- ПІДГОТОВКА ДОСТАВЛЮЮЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ**
 - Переходіться в тому, що ортопедична конструкція була попередньо оброблена відповідно до інструкцій виробника.

- ДОЗВУВАННЯ ПОРОШКУ ТА РІДИНИ**
 - Стандартне співвідношення порошok/ рідинa складає 1,8/1,0. Or (1 змівна ложка праша i 2 капляи текучини).

- МІШАННЯ**

Истисните праш i текућност на подлогу за мешанье. Користуйте пластичну spatulu додайте весь праш i текућност.Мешайте 20 секунд.

- ЦЕМЕНТИРАННЯ**
 - Закрийте внутренние раны доволноm количеством цемента i одmah гa поставите. Време рaдa je 2 минута од почeтka мeшaнья на 23°С (73,4° F). Дaхa Yкeскe Sicaklikaradacalısma sўresi kisalir.

- CEMENTIRANJE**
 - Restorasyonu için yüzeyleri siman ile kaplayınız ve hızlıca örtünüz.Calışma süresi, başlangıçtan itibaren 2 dakikadır. 23°C (73,4°F) daha yüksek sıcaklıklarda çalışma süresi kısaldır.

- KARŞITIRMA**
 - Restorasyonu için yüzeyleri siman ile kaplayınız ve hızlıca örtünüz.Calışma süresi, başlangıçtan itibaren 2 dakikadır. 23°C (73,4°F) daha yüksek sıcaklıklarda çalışma süresi kısaldır.

- AMBAJLARI**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- REK**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- AMBAJLARI**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- REK**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- AMBAJLARI**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- REK**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- AMBAJLARI**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- REK**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- AMBAJLARI**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- REK**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- AMBAJLARI**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- REK**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- AMBAJLARI**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- REK**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- AMBAJLARI**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- REK**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- AMBAJLARI**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- REK**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- AMBAJLARI**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- REK**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- AMBAJLARI**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- REK**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- AMBAJLARI**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- REK**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- AMBAJLARI**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- REK**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).

- AMBAJLARI**
 - 1.-1 paket: 35 gr Toz, 25 gr (20 ml) likit toz kaşığı, karıştırma spatulası (No. 20).
</